

令和2年度

ヒヤリ・ハット調査

「誤飲等による乳幼児の危険」

調査報告書

令和3年6月

東京都 生活文化局

目次

I. 調査概要	1
1. 調査の目的	1
2. 調査対象及び調査手法	1
(1) 調査対象者	1
(2) 回答者数	1
(3) 調査実施方法	1
(4) 調査期間	1
(5) 調査項目	1
3. 集計・分析にあたって	2
4. 自由記述の分類について	2
5. 「誤飲」「誤飲等」について	2
II. 調査結果	3
1. 回答者の基本情報	3
(1) 居住地	3
(2) 性別	3
(3) 年代	4
(4) 子供の人数	4
(5) 子供の年齢・性別	5
2. 乳幼児の誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（全体傾向）	6
(1) 乳幼児の誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無	6
(2) 医療機関受診状況	11
(3) 誤飲等及びヒヤリ・ハット時の年齢・性別	14
(4) 製品での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験	21
(5) 食品での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験	23
3. 乳幼児の誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（製品別傾向）	24
(1) 「たばこ」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験	24
(2) 「医薬品」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験	30
(3) 「玩具」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験	37
(4) 「洗剤」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験	42
(5) 「石鹸・化粧品等」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験	47
(6) 「乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験	52
(7) 「電池」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験	57
(8) 「その他家庭用品」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験	62
(9) 「食品」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験	67
(10) 「その他（食品）」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験	72

4. 乳幼児の誤飲等で特に危険と思う製品	76
5. 誤飲等を防ぐために気をつけていることや工夫	77
(1) 誤飲等を防ぐために気をつけていること	77
(2) 誤飲等を防ぐための工夫（概要）	78
(3) 誤飲等を防ぐための工夫（詳細事例）	79
6. 誤飲等をした時の応急処置の方法	82
7. その他の自由記述のまとめ	84
Ⅲ. まとめ	89
Ⅳ. アンケート調査内容	90

I. 調査概要

1. 調査の目的

この調査は、「誤飲等」による乳幼児（生後6ヶ月以上から小学校入学前の6歳児）の危害・危険について実態を把握するため、誤飲等及びヒヤリ・ハット経験について収集することを目的に実施した。

「誤飲」については、平成22年度にもヒヤリ・ハット調査「誤飲による乳幼児の危険」を行っているが、新たな製品及び食品による誤飲等の危害・危険が無いか調査項目を増やし今回の調査を実施した。あわせて、「誤飲等」した際の応急処置の方法について、保護者の認知度について調査した。

2. 調査対象及び調査手法

(1) 調査対象者

東京都に居住する生後6ヶ月以上～小学校入学前の乳幼児と同居する20歳以上の保護者
(参考 H22：東京都に居住する0歳から6歳までの子供がいる人)

(2) 回答者数

3,000人
(参考 H22：2,000人)

(3) 調査実施方法

インターネットアンケート
(参考 H22：インターネットアンケート)

(4) 調査期間

令和3年1月22日～1月26日
(参考 H22：平成22年7月15日～7月22日)

(5) 調査項目

誤飲等及びヒヤリ・ハット経験に関して、10項目の製品・食品別※に、以下の設問で調査

- ・誤飲等及びヒヤリ・ハット経験
- ・誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の危害・危険の程度
- ・誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の医療機関での処置
- ・誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の年齢・性別
- ・誤飲等及びヒヤリ・ハット製品の形状・用途
- ・誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の詳細
- ・誤飲等及びヒヤリ・ハットを防ぐために気をつけていることや工夫
- ・誤飲等及びヒヤリ・ハット時の応急処置の方法

(参考 H22：0歳～6歳の子供がいる人を対象に、子供の年齢が0歳～6歳までの間の誤飲経験の有無、医療機関受診状況、誤飲時の年齢・性別、誤飲したときの状況等について調査した。)

※ 1.「たばこ」2.「医薬品」3.「玩具」4.「洗剤」5.「石鹸・化粧品等」6.「乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等」7.「電池」
8.「その他の家庭用品」9.「食品」10.「その他の食品（酒、調味料、サプリメント等）」である。

3. 集計・分析にあたって

- ・回答比率（％）は、小数点以下第二位を四捨五入して算出した。そのため、回答比率を合計しても100%にならない場合がある。ただし、小数点以下第二位を四捨五入すると「0」となってしまう要素がある場合、小数点以下第三位を四捨五入して算出している。
- ・複数回答（MA）設問の場合、回答比率の合計が100%を超える場合がある。
- ・グラフに表記されている「N＝＊」「n＝＊」（＊は数字）は、対象の母数を表している。なお、Nはグラフ全体の母数、nは各項目の母数を表す。
- ・グラフや表の中での選択肢の文章が長い場合は、簡略化して表現しているため、アンケート調査票上の文言と一致していない場合がある。（アンケート調査票上の文言については、「IV. アンケート調査内容」を参照。）
- ・「誤飲経験がある」とは、乳幼児が「誤飲して入院した」「誤飲して病院へ行った」「誤飲したが病院へは行かなかった」との回答を示すものであり、「ヒヤリ・ハット経験がある」とは、乳幼児が「誤飲をしそうになった」との回答を示す。
- ・集計単位（件数、人数）については、事例に関する記載においては「件」、人数に関する記載においては「人」で統一している。

4. 自由記述の分類について

（1）全体

回答を分類する際は、原則として回答者の申告を採用した。

（2）製品の分類について

原則として、乳幼児がヒヤリ・ハット経験をした製品を採用した。

（3）事例の分類について

複数の事象が混在した回答は、原則として危害・危険の大きいものに分類したが、同程度である場合、複数の事象としてそれぞれ分類した。

5. 「誤飲」「誤飲等」について

本報告書においての「誤飲等」とは、異物を誤って飲み込み消化管に入った事例の他、窒息や異物が誤って気道内に入った事例（誤嚥^{ごえん}）、食品を飲食した際の窒息や乳幼時期の飲食に適さないものを誤って飲み込んでしまった事例についても含んでいる。

また、「ヒヤリ・ハット経験」とは、異物や乳幼児期の飲食に適さない食品を飲み込みそうになった（口にいれそうになった、口に入れたが飲み込まなかった）事例としている。

なお、アンケートの設問においては、「誤飲」として記載していることから、本文及び図表のアンケートの設問にかかる表記は「誤飲」としている。

Ⅱ．調査結果

1．回答者の基本情報

(1) 居住地

居住地は、「東京都」が 100.0%となっている。




図 1_1 居住地

(2) 性別

性別は、「男性」が 32.4%、「女性」が 67.6%となっている。




図 1_2 性別

(3) 年代

年代は、「20代」が12.9%、「30代」が58.0%、「40代」が27.3%、「50代以上」が1.8%となっている。




図 1_3 年代

(4) 子供の人数

子供の人数は、「1人」が47.1%「2人」が41.4%、「3人」が9.8%、「4人以上」が1.6%となっている。




図 1_4 子供の人数

(5) 子供の年齢・性別

回答者の子供（複数回答）の年齢・性別の割合を下図に示す。「小学生以上」が男女合計で29.5%と最も多く、次いで「4歳」が20.0%、「2歳」が19.9%となっている。




図 1_5 子供の年齢・性別

※ 今回の調査対象については、生後 6 か月から小学校入学前の乳幼児であるが、1 回答者の基本情報において、回答者の子供は複数回答としていることから、兄弟姉妹（生後 6 か月未満及び小学生）の人数についても含まれる。以降の誤飲等に関する調査においては、生後 6 か月から小学生入学前の乳幼児を対象としてアンケートを実施している。

※ 調査対象の乳幼児の年齢・性別区分は、0 歳児 161 人以上（男女毎）、1 歳から 6 歳児は各 231 人以上（男女毎）とし、おむね男女の割合を同等とした。

2. 乳幼児の誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（全体傾向）

（1）乳幼児の誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無

ア 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無

図 2_1 は、10 項目の製品・食品に関する誤飲等とヒヤリ・ハット経験の有無を示している。

「製品を所有しており、誤飲したことや、誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」

「製品を所有しているが、誤飲したことも誤飲しそうになってヒヤリとしたこともない」「製品を所有していない・購入していない」の設問に対し、1 項目でも誤飲及びヒヤリ・ハット経験があるとの回答者は 1,875 人（62.5%）で、全体の約 6 割であった。

平成 22 年度の調査においては、「誤飲したことがある」「誤飲しそうになった経験がある」との回答者は 1,512 人（75.7%）で、全体の 7 割を超えていた。





図 2_1 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（全体）



参考 H22：誤飲及びヒヤリ・ハット経験

図 2_2 は、10 項目の製品・食品別に収集した誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無を示している。「玩具」の誤飲等及びヒヤリ・ハット経験者が 3,000 人中 1,232 人（41.1%）と最も多く、次いで「食品」が 981 人（32.7%）、「その他の家庭用品」が 747 人（24.9%）と続く。




図 2_2 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（10 項目の製品・食品別）

イ 詳細製品別の誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無

表 2_1 は、10 項目の製品・食品で「製品を所有しており、誤飲したことや、誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」との回答者に、10 項目の製品・食品の内訳となる詳細製品別の誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無についてまとめた結果である。

(3) 玩具が 3,036 件（誤飲した：406 件、誤飲しそうになった：2,630 件）で最も多く、次に (9) 食品が 1,960 件（誤飲した：379 件、誤飲しそうになった：1,581 件）、(8) その他家庭用品が 1,711 件（誤飲した：328 件、誤飲しそうになった：1,387 件）と続く。

	誤飲したことがある	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	誤飲したりヒヤリとした経験はない	この製品は所有していない・購入していない	「誤飲した」、「誤飲しそうになった」の合計
(1) たばこ					
未使用のたばこ	15	89	37	35	104
未使用の電子たばこ	8	38	72	58	46
未使用の加熱式たばこ	4	46	68	58	50
使用済みのたばこ(吸殻・使用済みカプセル)	15	60	68	33	75
たばこの浸出液	7	29	89	51	36
その他のたばこ	6	10	47	113	16
たばこ【小計】	55	272	381	348	327
(2) 医薬品					
風邪薬	35	96	107	18	131
胃腸薬	8	33	160	55	41
外皮用薬	17	75	128	36	92
眼科用剤・耳鼻科用剤	4	42	172	38	46
その他の医薬品	14	28	103	111	42
医薬品【小計】	78	274	670	258	352
(3) 玩具					
ビー玉	20	284	433	495	304
ビーズ	37	243	491	461	280
ブロック・積み木	3	282	568	379	285
小さなゴムボール	16	255	857	104	271
ミニカー	12	178	833	209	190
食べ物の形をした玩具(ままごと玩具)	6	278	790	158	284
シール	160	423	569	80	583
玩具の弾丸(球状の小さな弾丸(BB弾等)、ソフト弾丸等)	13	112	522	585	125
シャボン玉液	67	283	682	200	350
ケミカルライト	7	39	567	619	46
磁石を使った玩具	8	141	749	334	149
その他の小型玩具	57	112	491	572	169
玩具【小計】	406	2630	7552	4196	3036
(4) 洗剤					
食器洗い用洗剤	12	38	96	11	50
衣料用洗剤	8	31	105	13	39
トイレ用洗剤	1	21	115	20	22
風呂用洗剤	3	28	112	14	31
漂白剤(食器用)	0	19	122	16	19
漂白剤(衣類用)	1	14	125	17	15
カビ取り剤	1	18	122	16	19
その他の洗剤	4	8	71	74	12
洗剤【小計】	30	177	868	181	207

	誤飲したことがある	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	誤飲したりヒヤリとした経験はない	この製品は所有していない・購入していない	「誤飲した」、「誤飲しそうになった」の合計
(5) 石鹸・化粧品等					
化粧品	26	98	116	18	124
マニキュア・マニキュア除去液	4	22	173	59	26
固形石鹸	9	46	157	46	55
ボディーシャンプー	19	63	154	22	82
歯磨き粉	28	46	168	16	74
シャンプー・リンス・コンディショナー	14	48	172	24	62
入浴剤	7	32	178	41	39
その他の石鹸・化粧品等	8	17	118	115	25
石鹸・化粧品等【小計】	115	372	1236	341	487
(6) 乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等					
乾燥剤・脱酸素剤（食品用）	13	95	65	18	108
消臭剤・脱臭剤	7	27	128	29	34
衣類用防虫剤	1	28	136	26	29
殺虫剤	1	34	122	34	35
保冷剤	8	46	120	17	54
その他の乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等	2	13	79	97	15
乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等【小計】	32	243	650	221	275
(7) 電池	9	222	59	7	231
(8) その他の家庭用品					
硬貨	9	166	534	38	175
磁気治療器	2	37	408	300	39
磁石	2	82	528	135	84
紙	229	299	188	31	528
ペットボトルの蓋	6	277	430	34	283
アクセサリ	5	114	576	52	119
ケーキの飾り	5	83	556	103	88
ビニール袋	44	166	505	32	210
水を含むと膨らむ製品	10	45	518	174	55
その他の家庭用品	16	114	378	239	130
その他の家庭用品【小計】	328	1383	4621	1138	1711
(9) 食品					
飴	127	286	446	122	413
パン	50	265	633	33	315
ベビー用のせんべい・ビスケット	42	172	717	50	214
ゼリー（こんにゃく入りゼリー以外）	18	116	746	101	134
こんにゃく入りゼリー	16	90	626	249	106
ご飯（米）	24	154	763	40	178
餅	6	130	696	149	136
果物	49	167	724	41	216
豆類	8	82	811	80	90
その他の食品	39	119	511	312	158
食品【小計】	379	1581	6673	1177	1960
(10) その他					
酒類	30	80	104	22	110
しょうゆ	6	39	173	18	45
アルコールを含む食品	8	47	156	25	55
健康食品・健康補助食品	5	26	169	36	31
その他	2	13	105	116	15
その他【小計】	51	205	707	217	256
【合計】	1483	7359	23417	8084	8842

表 2_1 詳細製品別の誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無に関する集計表

図 2_3 は、表 2_1 に示す詳細製品について、「誤飲したことがある」または「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」と回答が多い製品・食品（上位 20 品目）を示したものである。「シール」が 583 件（誤飲した：160 件、誤飲しそうになった：423 件）で最も多く、次に「紙」が 528 件（誤飲した：229 件、誤飲しそうになった：299 件）、「飴」が 413 件（誤飲した：127 件、誤飲しそうになった：286 件）と続く。




図 2_3 誤飲及びヒヤリ・ハット経験（詳細製品別上位 20 品目）

(2) 医療機関受診状況

表 2_2 は、10 項目の製品・食品の詳細製品別で誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の時に医療機関の受診状況についてまとめた結果である。

「飲み込んで医療機関に入院した」と「飲み込んで医療機関を受診した」を合わせた件数は、

(3) 玩具が 55 件（入院：5 件、受診：50 件）で最も多く、次に (8) その他家庭用品が 39 件（入院：5 件、受診：34 件）、(9) 食品で 32 件（入院：3 件、受診：29 件）と続く。

「飲み込んで医療機関に入院した」事例では、(1) たばこが 11 件と最も多い結果であった。

	合計	飲み込んで 医療機関に 入院した	飲み込んで 医療機関を 受診した	飲み込んだ が医療機関 は受診しな かった	口にいった が飲み込ま なかった	口に入れそう になった
(1) たばこ						
未使用のたばこ	104	3	4	8	31	58
未使用の電子たばこ	46	2	4	2	9	29
未使用の加熱式たばこ	50	0	1	3	16	30
使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル）	75	5	5	5	16	44
たばこの浸出液	36	0	3	4	10	19
その他のたばこ	16	1	3	2	4	6
たばこ【小計】	327	11	20	24	86	186
(2) 医薬品						
風邪薬	131	2	10	23	28	68
胃腸薬	41	0	2	6	8	25
外皮用薬	92	0	3	14	28	47
眼科用剤・耳鼻科用剤	46	1	1	2	14	28
その他の医薬品	42	2	6	6	9	19
医薬品【小計】	352	5	22	51	87	187
(3) 玩具						
ビー玉	304	1	4	15	181	103
ビーズ	280	0	8	29	133	110
ブロック・積み木	285	0	1	2	200	82
小さなゴムボール	271	0	1	15	191	64
ミニカー	190	0	0	12	136	42
食べ物の形をした玩具（ままごと玩具）	284	0	0	6	209	69
シール	583	0	10	150	359	64
玩具の弾丸（球状の小さな弾丸（BB弾等）、ソフト弾丸等）	125	1	3	9	55	57
シャボン玉液	350	0	5	62	101	182
ケミカルライト	46	1	2	4	11	28
磁石を使った玩具	149	2	1	5	70	71
その他の小型玩具	169	0	15	42	77	35
玩具【小計】	3036	5	50	351	1723	907
(4) 洗剤						
食器洗い用洗剤	50	0	6	6	11	27
衣料用洗剤	39	1	1	6	11	20
トイレ用洗剤	22	0	0	1	2	19
風呂用洗剤	31	0	1	2	8	20
漂白剤（食器用）	19	0	0	0	3	16
漂白剤（衣類用）	15	0	1	0	5	9
カビ取り剤	19	1	0	0	4	14
その他の洗剤	12	0	2	2	3	5
洗剤【小計】	207	2	11	17	47	130
(5) 石鹸・化粧品等						
化粧品	124	2	3	21	30	68
マニキュア・マニキュア除去液	26	0	1	3	6	16
固形石鹸	55	0	2	7	20	26
ボディシャンプー	82	0	2	17	17	46
歯磨き粉	74	0	1	27	20	26
シャンプー・リンス・コンディショナー	62	1	1	12	17	31
入浴剤	39	0	2	5	6	26
その他の石鹸・化粧品等	25	2	4	2	4	13
石鹸・化粧品等【小計】	487	5	16	94	120	252

	合計	飲み込んで 医療機関に 入院した	飲み込んで 医療機関を 受診した	飲み込んだ が医療機関 は受診しな かった	口にいった が飲み込ま なかった	口に入れそう になった
(6) 乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等						
乾燥剤・脱酸素剤(食品用)	108	3	3	7	26	69
消臭剤・脱臭剤	34	1	4	2	3	24
衣類用防虫剤	29	0	1	0	8	20
殺虫剤	35	0	0	1	9	25
保冷剤	54	0	1	7	24	22
その他の乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等	15	0	1	1	6	7
乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等【小計】	275	4	10	18	76	167
(7) 電池	231	2	6	1	83	139
(8) その他の家庭用品						
硬貨	175	2	3	4	87	79
磁気治療器	39	1	0	1	12	25
磁石	84	0	1	1	33	49
紙	528	0	8	221	239	60
ペットボトルの蓋	283	0	2	4	207	70
アクセサリ	119	0	2	3	46	68
ケーキの飾り	88	0	2	3	41	42
ビニール袋	210	0	6	38	121	45
水を含むと膨らむ製品	55	1	5	4	19	26
その他の家庭用品	130	1	5	10	58	56
その他の家庭用品【小計】	1711	5	34	289	863	520
(9) 食品						
飴	413	0	10	117	202	84
パン	315	2	1	47	208	57
ベビー用のせんべい・ビスケット	214	0	2	40	135	37
ゼリー(こんにやく入りゼリー以外)	134	0	1	17	69	47
こんにやく入りゼリー	106	1	3	12	61	29
ご飯(米)	178	0	1	23	113	41
餅	136	0	2	4	96	34
果物	216	0	5	44	137	30
豆類	90	0	2	6	54	28
その他の食品	158	0	2	37	89	30
食品【小計】	1960	3	29	347	1164	417
(10) その他						
酒類	110	1	2	27	13	67
しょうゆ	45	0	0	6	10	29
アルコールを含む食品	55	0	1	7	19	28
健康食品・健康補助食品	31	0	1	4	6	20
その他	15	0	0	2	5	8
その他【小計】	256	1	4	46	53	152
【合計】	8842	43	202	1238	4302	3057

表 2_2 詳細製品別の医療機関受診状況の集計表

図 2_4 は、表 2_2 に示す製品について、「飲み込んで医療機関に入院した」または「飲み込んで医療機関を受診した」と回答した件数が多い製品（上位 20 品目）を示したものである。

「飲み込んで医療機関に入院した」と「飲み込んで医療機関を受診した」を合わせた件数は、「風邪薬」が 12 件（入院：2 件、受診：10 件）で最も多く、次に「使用済みのタバコ」が 10 件（入院：5 件、受診：5 件）、「シール」と「飴」も 10 件（入院：0 件、受診：10 件）である。




図 2_4 医療機関への受診が多い品目（上位 20 品目）

(3) 誤飲等及びヒヤリ・ハット時の年齢・性別

ア 誤飲等及びヒヤリ・ハット時の年齢・性別（全体）

表 2_3 は、詳細製品別の誤飲等及びヒヤリ・ハット時の年齢・性別を集計した結果である。「1 歳」が 3,825 件（誤飲した：571 件、誤飲しそうになった：3,254 件）で最も多く、次に「0 歳」が 2,170 件（誤飲した：408 件、誤飲しそうになった：1,762 件）であった。

				年齢別(男女計)									
				合計	男児	女児	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳
(1) たばこ													
①未使用のたばこ				104	47	57	24	53	16	6	3	2	0
誤飲したことがある				15	10	5	4	10	1	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				89	37	52	20	43	15	6	3	2	0
②未使用の電子たばこ				46	18	28	9	22	11	1	2	1	0
誤飲したことがある				8	4	4	1	4	3	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				38	14	24	8	18	8	1	2	1	0
③未使用の加熱式たばこ				50	18	32	7	27	11	1	3	1	0
誤飲したことがある				4	0	4	2	1	1	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				46	18	28	5	26	10	1	3	1	0
④使用済みのたばこ(吸殻・使用済みカプセル)				75	33	42	10	37	16	7	3	2	0
誤飲したことがある				15	9	6	2	10	2	0	1	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				60	24	36	8	27	14	7	2	2	0
⑤たばこの浸出液				36	18	18	4	13	8	8	2	1	0
誤飲したことがある				7	5	2	1	2	3	1	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				29	13	16	3	11	5	7	2	1	0
⑥その他のたばこ				16	8	8	3	6	3	3	1	0	0
誤飲したことがある				6	0	6	1	2	1	1	1	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				10	8	2	2	4	2	2	0	0	0
たばこ【小計】				327	142	185	57	158	65	26	14	7	0
誤飲したことがある				55	28	27	11	29	11	2	2	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				272	114	158	46	129	54	24	12	7	0
(2) 医薬品													
①風邪薬				131	57	74	24	49	42	11	4	0	1
誤飲したことがある				35	15	20	2	13	15	4	1	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				96	42	54	22	36	27	7	3	0	1
②胃腸薬				41	17	24	7	21	9	2	2	0	0
誤飲したことがある				8	2	6	0	4	3	1	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				33	15	18	7	17	6	1	2	0	0
③外用薬				92	48	44	24	43	21	3	1	0	0
誤飲したことがある				17	8	9	3	10	4	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				75	40	35	21	33	17	3	1	0	0
④眼科用剤・耳鼻科用剤				46	22	24	11	20	9	4	2	0	0
誤飲したことがある				4	2	2	2	1	0	0	1	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				42	20	22	9	19	9	4	1	0	0
⑤その他の医薬品				42	19	23	8	14	13	4	3	0	0
誤飲したことがある				14	7	7	2	6	4	1	1	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				28	12	16	6	8	9	3	2	0	0
医薬品【小計】				352	163	189	74	147	94	24	12	0	1
誤飲したことがある				78	34	44	9	34	26	6	3	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				274	129	145	65	113	68	18	9	0	1
(3) 玩具													
①ビー玉				304	168	136	49	132	77	36	7	2	1
誤飲したことがある				20	11	9	2	11	5	1	1	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				284	157	127	47	121	72	35	6	2	1
②ビーズ				280	123	157	54	126	67	26	4	3	0
誤飲したことがある				37	22	15	6	9	11	9	1	1	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				243	101	142	48	117	56	17	3	2	0
③ブロック・積み木				285	156	129	44	134	75	26	5	1	0
誤飲したことがある				3	3	0	0	1	2	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				282	153	129	44	133	73	26	5	1	0
④小さなゴムボール				271	156	115	75	126	49	16	5	0	0
誤飲したことがある				16	8	8	4	5	3	3	1	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				255	148	107	71	121	46	13	4	0	0
⑤ミニカー				190	135	55	55	87	34	11	3	0	0
誤飲したことがある				12	7	5	3	8	1	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある				178	128	50	52	79	33	11	3	0	0

	合計	男児	女児	年齢別(男女計)						
				0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳
⑥食べ物の形をした玩具(ままごと玩具)	284	143	141	65	120	70	20	8	1	0
誤飲したことがある	6	3	3	0	4	1	1	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	278	140	138	65	116	69	19	8	1	0
⑦シール	583	277	306	199	288	74	19	3	0	0
誤飲したことがある	160	78	82	66	74	18	2	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	423	199	224	133	214	56	17	3	0	0
⑧玩具の弾丸(球状の小さな弾丸(BB弾等)、ソフト弾丸等)	125	75	50	30	60	26	5	2	2	0
誤飲したことがある	13	8	5	2	6	3	1	1	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	112	67	45	28	54	23	4	1	2	0
⑨シャボン玉液	350	178	172	34	142	120	50	2	2	0
誤飲したことがある	67	38	29	6	23	29	8	1	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	283	140	143	28	119	91	42	1	2	0
⑩ケミカルライト	46	22	24	14	19	8	5	0	0	0
誤飲したことがある	7	4	3	3	2	2	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	39	18	21	11	17	6	5	0	0	0
⑪磁石を使った玩具	149	72	77	40	69	32	6	2	0	0
誤飲したことがある	8	6	2	2	2	1	1	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	141	66	75	38	67	30	5	1	0	0
⑫その他の小型玩具	169	102	67	40	74	34	14	5	2	0
誤飲したことがある	57	38	19	12	25	10	5	4	1	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	112	64	48	28	49	24	9	1	1	0
玩具【小計】	3036	1607	1429	699	1377	666	234	46	13	1
誤飲したことがある	406	226	180	106	170	87	31	10	2	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	2630	1381	1249	593	1207	579	203	36	11	1
(4) 洗剤										
①食器洗い用洗剤	50	25	25	15	22	8	4	1	0	0
誤飲したことがある	12	6	6	3	5	2	2	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	38	19	19	12	17	6	2	1	0	0
②衣料用洗剤	39	21	18	8	23	4	1	3	0	0
誤飲したことがある	8	5	3	0	7	1	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	31	16	15	8	16	3	1	3	0	0
③トイレ用洗剤	22	13	9	4	9	4	2	2	1	0
誤飲したことがある	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	21	12	9	4	8	4	2	2	1	0
④風呂用洗剤	31	14	17	5	14	9	3	0	0	0
誤飲したことがある	3	2	1	0	2	1	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	28	12	16	5	12	8	3	0	0	0
⑤漂白剤(食器用)	19	8	11	0	10	4	5	0	0	0
誤飲したことがある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	19	8	11	0	10	4	5	0	0	0
⑥漂白剤(衣類用)	15	10	5	3	6	4	2	0	0	0
誤飲したことがある	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	14	9	5	3	6	3	2	0	0	0
⑦カビ取り剤	19	9	10	3	8	4	4	0	0	0
誤飲したことがある	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	18	8	10	3	8	3	4	0	0	0
⑧その他の洗剤	12	2	10	1	8	3	0	0	0	0
誤飲したことがある	4	1	3	0	4	0	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	8	1	7	1	4	3	0	0	0	0
洗剤【小計】	207	102	105	39	100	40	21	6	1	0
誤飲したことがある	30	17	13	3	19	6	2	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	177	85	92	36	81	34	19	6	1	0
(5) 石鹸・化粧品等										
①化粧品	124	63	61	36	55	23	10	0	0	0
誤飲したことがある	26	19	7	8	14	4	0	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	98	44	54	28	41	19	10	0	0	0
②マニキュア・マニキュア除去液	26	8	18	7	11	4	4	0	0	0
誤飲したことがある	4	1	3	1	2	0	1	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	22	7	15	6	9	4	3	0	0	0
③固形石鹸	55	23	32	10	30	11	3	1	0	0
誤飲したことがある	9	5	4	2	2	2	2	1	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	46	18	28	8	28	9	1	0	0	0
④ボディシャンプー	82	45	37	24	43	10	4	1	0	0
誤飲したことがある	19	11	8	5	10	3	1	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	63	34	29	19	33	7	3	1	0	0
⑤歯磨き粉	74	34	40	7	37	22	6	2	0	0
誤飲したことがある	28	12	16	1	14	10	2	1	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	46	22	24	6	23	12	4	1	0	0
⑥シャンプー・リンス・コンディショナー	62	32	30	12	35	6	7	2	0	0
誤飲したことがある	14	11	3	2	9	1	2	0	0	0
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	48	21	27	10	26	5	5	2	0	0

		合計	男児	女児	年齢別(男女計)						
					0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳
	⑦入浴剤	39	15	24	7	16	9	4	2	1	0
	誤飲したことがある	7	6	1	1	2	2	1	1	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	32	9	23	6	14	7	3	1	1	0
	⑧その他の石鹸・化粧品等	25	12	13	5	14	0	5	1	0	0
	誤飲したことがある	8	6	2	1	4	0	2	1	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	17	6	11	4	10	0	3	0	0	0
	石鹸・化粧品等【小計】	487	232	255	108	241	85	43	9	1	0
	誤飲したことがある	115	71	44	21	57	22	11	4	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	372	161	211	87	184	63	32	5	1	0
	(6)乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等										
	①乾燥剤・脱酸素剤(食品用)	108	55	53	29	50	13	11	5	0	0
	誤飲したことがある	13	8	5	5	4	1	2	1	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	95	47	48	24	46	12	9	4	0	0
	②消臭剤・脱臭剤	34	14	20	7	18	5	1	1	2	0
	誤飲したことがある	7	3	4	0	4	2	0	0	1	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	27	11	16	7	14	3	1	1	1	0
	③衣類用防虫剤	29	11	18	2	19	6	2	0	0	0
	誤飲したことがある	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	28	10	18	2	18	6	2	0	0	0
	④殺虫剤	35	16	19	8	20	4	2	1	0	0
	誤飲したことがある	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	34	15	19	7	20	4	2	1	0	0
	⑤保冷剤	54	18	36	12	24	13	4	1	0	0
	誤飲したことがある	8	0	8	3	3	1	1	0	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	46	18	28	9	21	12	3	1	0	0
	⑥その他の乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等	15	7	8	5	5	2	2	1	0	0
	誤飲したことがある	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	13	7	6	5	4	2	1	1	0	0
	乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等【小計】	275	121	154	63	136	43	22	9	2	0
	誤飲したことがある	32	13	19	9	13	4	4	1	1	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	243	108	135	54	123	39	18	8	1	0
	(7)電池	231	129	102	57	107	49	14	3	0	1
	誤飲したことがある	9	5	4	1	2	4	1	1	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	222	124	98	56	105	45	13	2	0	1
	(8)その他の家庭用品										
	①硬貨	175	85	90	36	83	34	18	3	1	0
	誤飲したことがある	9	1	8	1	3	2	2	1	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	166	84	82	35	80	32	16	2	1	0
	②磁気治療器	39	20	19	13	19	4	3	0	0	0
	誤飲したことがある	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	37	20	17	12	19	4	2	0	0	0
	③磁石	84	47	37	22	43	15	2	2	0	0
	誤飲したことがある	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	82	46	36	21	43	15	2	1	0	0
	④紙	528	269	259	271	197	49	11	0	0	0
	誤飲したことがある	229	113	116	130	79	17	3	0	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	299	156	143	141	118	32	8	0	0	0
	⑤ペットボトルの蓋	283	156	127	76	138	50	16	2	0	1
	誤飲したことがある	6	4	2	2	1	1	2	0	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	277	152	125	74	137	49	14	2	0	1
	⑥アクセサリ	119	50	69	37	52	22	8	0	0	0
	誤飲したことがある	5	3	2	2	2	0	1	0	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	114	47	67	35	50	22	7	0	0	0
	⑦ケーキの飾り	88	46	42	11	46	18	12	1	0	0
	誤飲したことがある	5	3	2	1	2	1	1	0	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	83	43	40	10	44	17	11	1	0	0
	⑧ビニール袋	210	105	105	111	73	17	7	1	1	0
	誤飲したことがある	44	18	26	24	16	2	1	0	1	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	166	87	79	87	57	15	6	1	0	0
	⑨水を含む膨らむ製品	55	21	34	14	26	9	4	1	0	1
	誤飲したことがある	10	5	5	1	5	2	1	1	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	45	16	29	13	21	7	3	0	0	1
	⑩その他の家庭用品	130	66	64	47	60	12	8	2	0	1
	誤飲したことがある	16	6	10	5	6	0	4	0	0	1
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	114	60	54	42	54	12	4	2	0	0
	その他の家庭用品【小計】	1711	865	846	638	737	230	89	12	2	3
	誤飲したことがある	328	154	174	168	114	25	16	3	1	1
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	1383	711	672	470	623	205	73	9	1	2

				年齢別(男女計)							
				合計	男児	女児	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳
(9) 食品											
①飴		413	200	213	32	109	105	106	39	15	7
	誤飲したことがある	127	70	57	8	17	29	42	20	9	2
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	286	130	156	24	92	76	64	19	6	5
②パン		315	161	154	81	151	52	22	7	1	1
	誤飲したことがある	50	28	22	14	26	5	2	3	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	265	133	132	67	125	47	20	4	1	1
③ベビー用のせんべい・ビスケット		214	109	105	90	96	18	6	2	2	0
	誤飲したことがある	42	15	27	16	17	4	1	2	2	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	172	94	78	74	79	14	5	0	0	0
④ゼリー(こんにやく入りゼリー以外)		134	64	70	19	42	46	19	5	3	0
	誤飲したことがある	18	11	7	3	5	6	2	2	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	116	53	63	16	37	40	17	3	3	0
⑤こんにやく入りゼリー		106	54	52	8	26	41	23	4	4	0
	誤飲したことがある	16	9	7	1	6	7	0	0	2	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	90	45	45	7	20	34	23	4	2	0
⑥ご飯(米)		178	97	81	48	85	29	10	5	1	0
	誤飲したことがある	24	10	14	6	10	4	3	1	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	154	87	67	42	75	25	7	4	1	0
⑦餅		136	57	79	8	31	51	28	11	3	4
	誤飲したことがある	6	2	4	1	1	2	1	1	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	130	55	75	7	30	49	27	10	3	4
⑧果物		216	108	108	63	99	34	18	2	0	0
	誤飲したことがある	49	26	23	15	24	5	4	1	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	167	82	85	48	75	29	14	1	0	0
⑨豆類		90	41	49	15	37	25	7	4	1	1
	誤飲したことがある	8	5	3	0	3	3	0	1	0	1
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	82	36	46	15	34	22	7	3	1	0
⑩その他の食品		158	74	84	22	52	42	24	10	6	2
	誤飲したことがある	39	20	19	5	9	10	11	2	2	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	119	54	65	17	43	32	13	8	4	2
食品【小計】		1960	965	995	386	728	443	263	89	36	15
	誤飲したことがある	379	196	183	69	118	75	66	33	15	3
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	1581	769	812	317	610	368	197	56	21	12
(10) その他											
①酒類		110	68	42	16	39	22	16	8	6	3
	誤飲したことがある	30	18	12	6	11	2	5	2	3	1
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	80	50	30	10	28	20	11	6	3	2
②しょうゆ		45	24	21	9	20	12	4	0	0	0
	誤飲したことがある	6	3	3	1	1	3	1	0	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	39	21	18	8	19	9	3	0	0	0
③アルコールを含む食品		55	32	23	11	14	17	8	2	2	1
	誤飲したことがある	8	3	5	2	1	2	1	2	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	47	29	18	9	13	15	7	0	2	1
④健康食品・健康補助食品		31	14	17	8	16	4	2	1	0	0
	誤飲したことがある	5	0	5	1	1	1	1	1	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	26	14	12	7	15	3	1	0	0	0
⑤その他		15	8	7	5	5	3	1	1	0	0
	誤飲したことがある	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	13	8	5	4	4	3	1	1	0	0
その他【小計】		256	146	110	49	94	58	31	12	8	4
	誤飲したことがある	51	24	27	11	15	8	8	5	3	1
	誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	205	122	83	38	79	50	23	7	5	3
【合計】		8842	4472	4370	2170	3825	1773	767	212	70	25
誤飲したことがある		1483	768	715	408	571	268	147	62	22	5
誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある		7359	3704	3655	1762	3254	1505	620	150	48	20

表 2_3 詳細製品別の誤飲等及びヒヤリ・ハット時の年齢・性別集計表

図 2_5 は、表 2_3 に示した誤飲等及びヒヤリ・ハット時の年齢を示している。1 歳児が最も多く、年齢が上がるにつれ誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の件数は減少している。




図 2_5 誤飲等及びヒヤリ・ハット時の年齢（全体）

図 2_6 は、表 2_3 に示した男女分布を集計した結果である。「男児」の事例が 4,472 件、「女児」の事例が 4,370 件であった。







図 2_6 男女分布

イ 年齢別にみた誤飲等及びヒヤリ・ハットが多い製品

図 2_7 は、表 2_3 に示した誤飲等及びヒヤリ・ハット時の年齢別に「誤飲した」または「誤飲しそうになった」件数が多い製品（上位 5 品目）を示したものである。

0 歳では「紙」、1 歳では「シール」、2 歳では「シャボン玉液」、3 歳～6 歳では「飴」が最も多い。年齢が上がるにつれ、製品の誤飲等は少なくなり食品の誤飲等が多くなる傾向である。









図 2_7 年齢別の誤飲等及びヒヤリ・ハット経験が多い製品（上位 5 品目）

(4) 製品での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

図 2_8 は、表 2_1 に示した全品目の事例 8,842 件の内、食品の事例 2,216 件（9. 食品 1,960 件、10 その他 256 件）を除いたものについて、「誤飲したことがある」または「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」と回答数が多い製品（上位 20 品目）を示したものである。

「誤飲したことがある」と「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」を合わせた数は、「シール」が 583 件（誤飲した：160 件、誤飲しそうになった：423 件）で最も多く、次に「紙」が 528 件（誤飲した：229 件、誤飲しそうになった：299 件）、「シャボン玉液」が 350 件（誤飲した：67 件、誤飲しそうになった：283 件）と続いている。





図 2_8 製品での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（上位 20 品目）

参考：平成 22 年度の調査においては、「紙類」が 522 件（誤飲しそうになった：226 件、誤飲した：296 件）で最も多く、次いで「シール」502 件（誤飲しそうになった：319 件、誤飲した：183 件）と続き、以下、「シャボン玉液」「ビー玉」「ペットボトルの蓋」とあるが、本年度の調査においても同様の製品が上位となっている。



参考 H22:品目別誤飲経験の有無（上位 20 位）

(5) 食品での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

図 2_9 は、表 2_1 に示した食品の事例 2,216 件（9. 食品 1,960 件、10 その他 256 件）について、「誤飲したことがある」または「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」との回答数が多い食品を示したものである。

「誤飲したことがある」と「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」を合わせた数は、「飴」が 413 件（誤飲した：127 件、誤飲しそうになった：286 件）で最も多く、次に「パン」が 315 件（誤飲した：50 件、誤飲しそうになった：265 件）、「果物」が 216 件（誤飲した：49 件、誤飲しそうになった：167 件）と続く。




図 2_9 食品での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

3. 乳幼児の誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（製品別傾向）

（1）「たばこ」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

ア 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無

図 3_1 は、「たばこ」全体での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験を示しており、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」が 176 人（5.9%）である。

また、「たばこ」全体で、製品を所有していない・購入していないとの回答が 7 割以上であった。




図 3_1 「たばこ」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（全体）

図 3_2 は、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」との回答者 176 人に、たばこの種類・使用の有無・浸出液等の詳細を複数回答で調査した結果である。

「誤飲したことがある」と「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」の合計は「未使用のたばこ」が 104 件（誤飲した：15 件、誤飲しそうになった：89 件）で最も多く、次に「使用済みのたばこ」が 75 件（誤飲した：15 件、誤飲しそうになった：60 件）、「未使用の加熱式たばこ」が 50 件（誤飲した：4 件、誤飲しそうになった：46 件）と続く。




図 3_2 「たばこ」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（詳細製品）

イ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況

図 3_3 は、誤飲または誤飲しそうになった時に「たばこ」が置かれていた場所をたばこの種類ごとに示しており、「未使用のたばこ」は「たばこの箱の中」が一番多く 37 件である。「使用済みのたばこ」では「灰皿の上」が一番多く 22 件である。

「たばこ」をカバンの中や子供の手の届かないところへ置いたが、子供が取り出し、箱を開けて口に入れた事例や、ごみ箱に捨てた「たばこ」を口に入れた事例もあり、「たばこ」の保管場所や捨てる時には注意が必要である。




図 3_3 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の「たばこ」が置かれていた場所

ウ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況（詳細事例）

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
1	未使用のたばこ	誤飲等	男児 1 歳	夜中にリビングの机の上にタバコを置いたままにしていたのを、翌朝タバコを若干かじっているところを発見した。ほんの少しだけだったので、病院には行かず、吐き戻しもさせずに様子を見た。 （応急処置方法を調べて、小児科の HP を参考にした）
2	未使用のたばこ	誤飲等	女児 1 歳	一時的に手が届かないと思っていたテーブルの上に置いていたところ、目を離した隙に一本箱から出して誤飲してしまった。幸いすぐに親が指で吐き出させることができたが、残っていたら心配だったので救急車を呼んで搬送してもらった。子どもの体調も悪くなることもなく、医師の判断で入院せずに帰宅した。
3	未使用のたばこ	誤飲等	男児 1 歳	旅行に出かけた際、旅館に泊まって朝子供だけが早く起きて机の上にあったタバコを口に入れてしまっていた。しばらく様子を見ていたが、食事の際に吐いてしまい、すぐに病院を受診した。結果的には口に入れただけで飲み込んではいなかったと言われたが、子供によっては吐き気を催す成分が入っているので吐いてしまったのではないかとの事で、その後は元気に過ごしていた。
4	未使用のたばこ	ヒヤリ	女児 0 歳	箱を振って、未使用のタバコ 1 本が床に落ちて、それを口に入れようとしていた。
5	未使用のたばこ	ヒヤリ	女児 1 歳	夫が吸っているがいつも気を付けているのに、その時は気づかず落としていたようで、子供が手に持っていた。
6	未使用のたばこ	ヒヤリ	女児 2 歳	机の上に置いてあるタバコを取り出し、口に入れていたので慌てて取り上げて口の中をかきだした。すぐにうがいをして様子を見た。
7	未使用のたばこ	ヒヤリ	男児 1 歳	歩くようになり、色々なところに手が届くので、気をつけていたが、たまたま手の届かないところに置くのを忘れてしまい、その時にたばこに手を伸ばして箱をあけていた。
8	未使用のたばこ	ヒヤリ	女児 0 歳	子供の手の届く所にあつて、口に入れてたが吐き出して苦い顔をしていた。
9	未使用のたばこ	ヒヤリ	男児 1 歳	いつもは、手の届かないところに置き、入らないように柵をつけてたが、入ってしまい食器を洗ってる間に触っていた。見てなかったら口に入れていた可能性もある。
10	未使用のたばこ	ヒヤリ	女児 1 歳	テーブルの上に置いたタバコを口に入れてしまった。ただ食べようとしたのではなくタバコを咥える真似をしたかったようです。
11	未使用のたばこ	ヒヤリ	女児 0 歳	知らない間に箱の中から床に落ち、それに気づいた子供が拾っていた。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
12	未使用のたばこ	ヒヤリ	男児 0 歳	夫がタバコを吸おうと思ったがライターを持ってくるのを忘れ、手に持っていたタバコを息子が届かないであろうと思っていたカウンターの上にいき、ライターを取りに行った。ライターを取りに戻ると、息子が椅子に登ってタバコを手にとっておりかじっていた。
13	未使用のたばこ	ヒヤリ	女児 1 歳	ポケットから未使用のタバコが机の隅に落ち、目を離した際に、机の上から子供がタバコを取り、かじった。かじった瞬間に気づき、吐き出させて処置したので病院へ連れて行ってはいない。
14	未使用のたばこ	ヒヤリ	男児 1 歳	届かないと思い机の上に置いてあり、たまたま床にあった本を台にしてたばこを手にした。ただ、口に入れる前に気が付いた。
15	未使用のたばこ	ヒヤリ	女児 0 歳	机の上に置いてあったタバコを破いて、たばこの葉を握って遊んでいた。
16	未使用のたばこ	ヒヤリ	女児 1 歳	かばんの中に入れていていたのを、目を離していたら、タバコの葉が床に散乱していて、娘がタバコを持っていた。
17	未使用のたばこ	ヒヤリ	男児 1 歳	夫がポケットに箱を入れたまま眠ってしまい、目が覚めると横で寝ていた子どもがかじっていた。飲み込んだ様子は無かったので病院へ行かず様子を見た。
18	未使用のたばこ	ヒヤリ	男児 0 歳	急いでいたのでテーブルの上に置いていたら、口に入れそうになっていた。
19	未使用のたばこ	ヒヤリ	男児 1 歳	テーブルの上に置いていた箱のタバコから一本取り出し、中の葉をむしっていた。一步遅ければ口に入れていた。
20	未使用の電子たばこ	誤飲等	女児 1 歳	夫が開封済みの電子タバコの箱を玄関先に置いたままその存在を忘れていた。私はタバコの箱に気がつかず台所で洗い物をしている時に子どもがタバコをくわえていることに気がついた。先端が少し欠けていたため医療機関を受診し念のため入院となった。
21	未使用の電子たばこ	ヒヤリ	女児 1 歳	こどもの手の届かない場所に置いていた筈が、いつの間にか取ったようで中身を取り出していた。幸い口には入れていなかった。
22	未使用の電子たばこ	ヒヤリ	男児 1 歳	床の上にあったかばんを開け、中に入った物を出していた。そのうちの 1 つの未使用の電子タバコを口にくわえているところを見つけ、急いで取り上げたが、誤飲した可能性があるため、急いで小児科へ連れて行った。
23	未使用の電子たばこ	ヒヤリ	男児 1 歳	手の届かないところに置いたつもりが、いつのまにか手にしていた。
24	未使用の電子たばこ	ヒヤリ	男児 1 歳	父親がリビングに落としたものを子供が発見した。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
25	未使用の加熱式たばこ	誤飲等	女兒 1 歳	目を離した隙に、置いてあった箱から取り出し、口の中に入れて食べていた。
26	未使用の加熱式たばこ	ヒヤリ	女兒 0 歳	スマホを見ているうちに箱に入っているたばこを取り出し、口に入れていた。苦くて出した様子で状態変化もなかったので病院受診はしなかった。
27	未使用の加熱式たばこ	ヒヤリ	女兒 2 歳	親のポケットに入れていたものが落ちて、机の上に置きっぱなしになっていた。子どもが気になってそれらを一本ずつ並べ始めた。親は気づかず、トイレに行っていた。そのうちに一つを口に入れようとしていたところ、トイレから戻った親が止めたので、口に入れようとしたところで止まった。
28	未使用の加熱式たばこ	ヒヤリ	男児 1 歳	主人が隠れてタバコを吸っていた為、カバンの中にタバコが入っているのを私が知らず、子どもが先に起きておもちゃで遊んでいると思っていたら、カバンからタバコを出してくわえようとしていた。慌てて取り上げに行ったが、取り上げる前に少し咥えてしまった。
29	未使用の加熱式たばこ	ヒヤリ	女兒 1 歳	机の上によじ登り、箱から出していた。
30	使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル）	誤飲等	女兒 1 歳	ゴミ箱の一番上に捨ててあったものを口に入れたらしく、葉っぱがついていた。
31	使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル）	誤飲等	女兒 2 歳	手が届かないところに置いていたゴミ箱を、いつの間にかひっくり返し、タバコの吸い殻を手でぐちゃぐちゃにしており、それを口に入れていた。少量だったので救急に電話をし様子見で大丈夫と言われた。
32	使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル）	誤飲等	男児 1 歳	床に置いていたゴミ箱の中の上にあった吸い殻を目を離したすきにくちゃくちゃしてしまっていた。
33	使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル）	誤飲等	男児 1 歳	手の届くところに灰皿があり、その中のタバコを食べていた。
34	使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル）	誤飲等	女兒 1 歳	夜に吸って灰皿をテーブルに置いておいたら、朝起きて子供がリビングにいて、私がトイレに行っている間にちぎって口に入れたようだった。
35	使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル）	ヒヤリ	女兒 1 歳	届かない所に置いてあったはずのゴミ箱からあさり出して遊んでいた。
36	使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル）	ヒヤリ	男児 0 歳	吸い殻を缶に入れて机の上に置いてあることが多く、それを子どもが手にとって飲みかけた。
37	使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル）	ヒヤリ	女兒 1 歳	ゴミ箱に捨ててあるタバコを拾っておまごとをしていた。吸っているパパのまねをして口にしようとしていた。

(2)「医薬品」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

ア 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無

図 3_4 は、「医薬品」全体での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験を示しており、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」が 256 人（8.5％）である。




図 3_4 「医薬品」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（全体）

図 3_5 は、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」との回答者 256 人に、医薬品の種類を複数回答で調査した結果である。「誤飲したことがある」と「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」の合計は「風邪薬」が 131 件（誤飲した：35 件、誤飲しそうになった：96 件）で最も多く、次に「外皮用薬」が 92 件（誤飲した：17 件、誤飲しそうになった：75 件）、「眼科用薬・耳鼻科用薬」が 46 件（誤飲した：4 件、誤飲しそうになった：42 件）と続いている。




図 3_5 「医薬品」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（詳細製品）

イ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況

表 3_1 は、「医薬品」を誤飲等した際に医療機関で受けた処置について示しており、「胃洗浄」が一番多く、「風邪薬」で 6 件「その他の医薬品」で 3 件処置を受けていた。

	合計	経過観察	胃洗浄	点滴・投薬	血液検査	その他
(2) 医薬品						
風邪薬 ※解熱鎮痛剤、呼吸器官用薬等	12	5	6	1	0	0
胃腸薬	2	2	0	0	0	0
外皮用薬 ※かぶれ用薬、消毒液等	3	2	1	0	0	0
眼科用剤・耳鼻科用剤 ※点眼薬、点鼻薬等	2	1	0	1	0	0
その他の医薬品 ※アレルギー薬等	8	3	3	2	0	0
医薬品【小計】	27	13	10	4	0	0

表 3_1 医療機関で受けた処置（医薬品）

表 3_2 は、誤飲もしくは誤飲しそうになった「医薬品」の製品の形状について示している。「風邪薬」、「胃腸薬」、「その他の医薬品」では「固形・錠剤・カプセルタイプ」、「外皮用薬」では「軟膏・クリームタイプ」、「眼科用剤・耳鼻科用剤」では「液体・ジェル・シロップタイプ」の形状であった。

	合計	固形・錠剤・カプセルタイプ	粉末・顆粒タイプ	液体・ジェル・シロップタイプ	軟膏・クリームタイプ	その他	わからない
(2) 医薬品							
風邪薬 ※解熱鎮痛剤、呼吸器官用薬等	131	96	26	9	0	0	0
胃腸薬	41	24	10	7	0	0	0
外皮用薬 ※かぶれ用薬、消毒液等	92	7	7	20	58	0	0
眼科用剤・耳鼻科用剤 ※点眼薬、点鼻薬等	46	9	9	26	2	0	0
その他の医薬品 ※アレルギー薬等	42	30	5	6	1	0	0
医薬品【小計】	352	166	57	68	61	0	0

表 3_2 製品の形状・種類（医薬品）

図 3_6 は、誤飲もしくは誤飲しそうになった「医薬品」の容器・包装の種類について示しており、「風邪薬」は「SP 包装」、「胃腸薬」は「PTP 包装」、「外皮用薬」は「チューブ」が一番多い結果となった。

「医薬品」が容器や包装に入っているにもかかわらず、子供が包装や蓋をあけて薬を口に入れたり、チューブをかんでしまい中から薬が漏れ出て口に入れた事例もあり、容器に入っているにもかかわらず子供の手の届かない場所へ保管するなど必要である。




図 3_6 製品の容器・包装（医薬品）

※包装について

PTP 包装	SP 包装
プラスチックに作ったくぼみに薬を入れて、アルミ箔などを貼り合わせた作りで中の錠剤が見える。指で押し出して薬を取り出すタイプ。	薬をアルミやプラスチックのフィルムに 1 錠や 1 回分ずつはさんで包装したもの。包装をやぶって薬を取り出す。
	

ウ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況（詳細事例）

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
1	風邪薬	誤飲等	男児 1 歳	腰の高さ程のワゴンに、処方してもらった紙袋ごと錠剤を置いておいた。つかまり立ちでは届かないと思っていたが、背伸びと手を伸ばすことで届いたようで、薬のシートを取り出して舐めていた。シートの一部が破れて、中の錠剤が唾液で溶けており、半分ぐらいのサイズになっていた。子供の口の中はラムネを食べた後のような状態だった為、母子手帳に書いてある誤飲ダイヤルに電話で相談した。子供にも処方する薬であったこと、量も多くはないことから病院にかからず様子を見るように指示を受けた。（夜 21 時ごろ）。
2	風邪薬	誤飲等	男児 3 歳	私が飲もうとして、錠剤を出したところ子供が口に入れてしまった。お菓子に見えて口にしたらと思う。
3	風邪薬	誤飲等	女児 3 歳	2 人子供がいるが、姉に飲ませるために用意していた風邪薬を妹が間違えて飲んでしまった。
4	風邪薬	誤飲等	男児 1 歳	弟が病院で処方されたシロップを飲んでいるのを見て、自分も飲みたいと言い出し、目を離した隙に弟の残りのシロップを全部飲んでしまった。咳止めで量も少ないため病院には受診していない。
5	風邪薬	誤飲等	男児 1 歳	うっかり手の届くところに置いておいた、大人の風邪薬を飲み込んでしまった。
6	風邪薬	誤飲等	男児 1 歳	普段使用するバッグの中に、小分けにしてチャック付きのポーチに入れておいたものを、目を離していた隙に出して 1 粒食べていた。ネットで調べ、救急病院へ受診したほうがいいのか専門機関へ電話相談したが、様子をみれば大丈夫とのこと。その後大事にも至らなかった。
7	風邪薬	誤飲等	女児 3 歳	美味しかったのか、目を離したすきに蓋を開けて飲んでた。残りがかなり少なかったので病院に行くついでに相談したが特に問題なかった。
8	風邪薬	誤飲等	男児 2 歳	ラムネだと思って引き出しから出してなめた。錠剤の半分だけだったが、相談センターに電話して病院には行かなかった。
9	風邪薬	誤飲等	男児 2 歳	知らない間にカプセルを一錠飲んでしまい、子供の誤飲専門電話相談に問い合わせたところ、ひとまず様子を見るように言われ、病院へいかず様子を見ていた。特に変わった様子はなく大事には至らなかった。
10	風邪薬	ヒヤリ	女児 2 歳	大人用の風邪薬の容器を嚙んで、中身が少し口に入ってしまった。
11	風邪薬	ヒヤリ	男児 1 歳	通常は置かない場所に置いてあり、目を離した隙に開けて食べようとしていた。
12	風邪薬	ヒヤリ	女児 2 歳	うたた寝をしていた時に、鞆の中に入れていた PTP 包装の鎮痛剤を出して、口に入れていた。ゴムで何錠か縛って留めてあり、何錠か使用していたため、誤飲しているのか飲んでいないのか、判断が出来ず不安だった。開封済みは数錠だったので、おそらく飲んだとしても 1 錠だろうと 1 日様子を見て、問題なかったため医療機関は受診しなかった。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
13	風邪薬	ヒヤリ	男児 0 歳	化粧ポーチに入れていた錠剤を、私が化粧中に子供が取り出していた。パッケージは破れないだろうと思い、そのままにしたところ錠剤をつまみ出していた。口には入れなかったがすぐ取り上げて手を拭いた。
14	風邪薬	ヒヤリ	女児 2 歳	薬の入っている引き出しは少し高い位置にあったのに、椅子の上に登って開け、中に入っていた痛み止めの錠剤を取り出して、薬で遊んでいた。気づいた時は薬が何個も飛び出して散らかっていて、飲んだかと慌てたが空と薬の数は合っていたので、飲み込んではいないようだった。
15	胃腸薬	誤飲等	女児 2 歳	テーブルの上にあった瓶の蓋を開け、ラムネのように食べていた。医師に相談したところそのまま様子を見るだけで良いと言われたので観察のみしていた。
16	胃腸薬	ヒヤリ	男児 4 歳	子供の手の届く所に薬が放置してあり、好奇心から開封し、口に入れようとしていた。
17	外皮用薬	誤飲等	男児 1 歳	夜寝ている時に塗ったしたものを朝起きたら、手に持って口に入れていた。
18	外皮用薬	誤飲等	女児 0 歳	蓋を閉め忘れ、目を離した隙に舐めてしまった。
19	外皮用薬	誤飲等	男児 1 歳	子供の手の届くところに置きっぱなしにしてしまい、目を離した隙に子供が手に取り、かじって遊んでしまった。かじったためチューブが破れ、中の薬が漏れて口の中が薬だらけになってしまった。調べたところ量的に問題なさそうだったので、家で様子を見た。
20	外皮用薬	誤飲等	女児 2 歳	キャップのしまりが甘く、簡単に開けられてしまい、スポンジヘッドのところを舐めてしまった。微量だったので、口の中を洗い、家で様子を見た。
21	外皮用薬	誤飲等	男児 1 歳	舐めて遊んでいたところ蓋が取れたらしく、中身が飛び出していた。お茶を飲ませたら落ち着いたので病院には行かず、翌日の様子も変わらなかったため受診はしなかった。
22	外皮用薬	誤飲等	女児 1 歳	目を離した隙に気づいたらかなりの量を舐めたり、顔に塗っていた。
23	外皮用薬	誤飲等	男児 1 歳	チューブを噛んでいたようで液が漏れて誤飲。変な味だったからか自分で伝えにきた。緊急に連絡したが少量だったので様子見で済んだ。
24	外皮用薬	誤飲等	男児 1 歳	蓋が閉めてあったが、噛みちぎって食べてしまった。
25	外皮用薬	誤飲等	女児 2 歳	風呂上がり保湿剤を乾燥防止に塗っていた。気づいたらチューブを吸っていた。少量だったため病院には行かず様子を見た。
26	外皮用薬	ヒヤリ	女児 2 歳	自分で塗りたいがるようになり、手につけたものを口に入れようとした。
27	外皮用薬	ヒヤリ	男児 2 歳	乾燥肌なので普段体に塗っているが、テーブルに置いて手を洗っている隙に、キャップを口で噛んで外して中身を出そうとしていた。
28	外皮用薬	ヒヤリ	男児 0 歳	風呂上がりに使うため、床に置きっぱなしで少し離れたら、下の子が手に取って口に入れていたところを発見した。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
29	外皮用薬	ヒヤリ	男児 0 歳	軟膏を塗るためにキャップを外し、大人の後ろにチューブのキャップを隠していたが、いつのまにか手を伸ばして遊んでいた。チューブの軟膏の蓋を口の中に入れて飲み込みそうになっていたところを口から取り出した。
30	外皮用薬	ヒヤリ	女児 0 歳	お風呂上がりに軟膏を持ちながら子供に塗っていたら、手を伸ばしてきてその手を舐めそうになった。
31	外皮用薬	ヒヤリ	男児 1 歳	体に塗ろうと置いておいて、少し目を離れた隙にフタを開けて舐めようとしていた。
32	外皮用薬	ヒヤリ	女児 0 歳	お風呂あがりに子どもの体にぬっており、蓋を閉めずにいたところ、液体が出る部分を口に入れそうになっていた。
33	眼科用剤・耳鼻科用剤	ヒヤリ	女児 1 歳	子供の点眼薬を、蓋もついてるし心配ないだろうと子供に持たせていたら、目を離している隙に蓋を開けたらしく、見たら蓋の開いた点眼薬を口にくわえていた。飲み込んだかどうかはわからなかったが、特に異常は出なかった。
34	その他の医薬品	誤飲等	女児 1 歳	薬を飲もうとシートから出してテーブルに置き、水を取りに台所に行っている間に子供がラムネと間違えて飲み込んでしまった。
35	その他の医薬品	誤飲等	男児 1 歳	目をはなした隙に飴と間違えたのか、一粒舐めていた。すぐ吐き出させて様子をみたがなんともないようだったので、病院には行かずにすませた。
36	その他の医薬品	誤飲等	男児 2 歳	薬箱の中に入れていた物を、いつの間にか出し、ラムネを取り出す要領で取り出し一粒食べてしまった。美味しくなかったようで、少し口から出したが半分位は飲み込んでしまったようだった。しばらく様子をみていたが、何事もなく元気に過ごしていたため、病院には行かなかった。
37	その他の医薬品	誤飲等	女児 1 歳	アレルギー薬を誤飲し、医療機関を受診した。
38	その他の医薬品	誤飲等	女児 1 歳	祖父が机の上に置いていたものがなくなったため、誤飲の可能性があり、救急外来で診察、観察入院をした。
39	その他の医薬品	ヒヤリ	男児 2 歳	普段なら手の届かない所に大人のアレルギー薬を置いていたが、椅子を持ってきて登ってそれを見つけ、お菓子だと思ったのか食べようと包装をやぶろうとしていた。
40	その他の医薬品	ヒヤリ	女児 1 歳	目を離れた隙に、薬を中から出して口に入れてたので、慌てて指をつっこんで口から取り出した。
41	その他の医薬品	ヒヤリ	男児 2 歳	錠剤をシートから出して手に持っていた。

(3) 「玩具」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

ア 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無

図 3_7 は、「玩具」全体での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験を示しており、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」が 1,232 人 (41.1%) である。




図 3_7 「玩具」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（全体）

図 3_8 は、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」との回答者 1,232 人に玩具の種類について複数回答で調査した結果である。「誤飲したことがある」と「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」の合計は「シール」が 583 件（誤飲した：160 件、誤飲しそうになった：423 件）で最も多く、次に「シャボン玉」が 350 件（誤飲した：67 件、誤飲しそうになった：283 件）、「ビー玉」が 304 件（誤飲した：20 件、誤飲しそうになった：284 件）と続いている。




図 3_8 「玩具」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（詳細製品）

イ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況（詳細事例）

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
1	ビー玉	誤飲等	女兒 1 歳	いつの間にか無くなり、探したが見つからなかった。翌日、オムツの中に便と一緒に出てきた。何も起きずに出てきたので良かったが、喉などに詰まらせていたらと思うとヒヤッとした。
2	ビー玉	誤飲等	女兒 1 歳	遊んでいて目を離した隙に、ビー玉を飲み込んでいた。
3	ビー玉	ヒヤリ	男児 3 歳	遊んでいたはずのビー玉がない事に気づき、まさかと思ってみたら、口の中にあった。
4	ビーズ	誤飲等	女兒 3 歳	子供のおもちゃのネックレスがちぎれてバラバラになってしまい、拾い集めている途中で口にいれてしまい飲み込んだ。沢山飲み込んだ訳ではないので便から出ると思い病院へは行かなかった。
5	ビーズ	誤飲等	男児 1 歳	上の子のお箸練習用のプラスチックでできた豆粒を誤飲した。親は気づかず、排便と一緒に出てきてきづいた。
6	ビーズ	ヒヤリ	男児 1 歳	ペットボトルの中に入れて音を鳴らして遊んでいたが、目を離したらフタを開けてビーズを口に入れていた。
7	小さなゴムボール	ヒヤリ	男児 3 歳	ままごとで遊んでいて、口に入れて噛み砕いていた。すぐに口から出して飲み込むことはなかった。
8	小さなゴムボール	ヒヤリ	女兒 4 歳	子供が小さなゴムボールを手を持っていて、手品をするから目をつぶってと言われて薄目を開けて見ていたら、口の中に隠すのが見えたので、急いで口の中から出させた。
9	小さなゴムボール	ヒヤリ	女兒 1 歳	小さなゴムボールが部屋の隅にころがっていて、それを知らぬ間に口に入れていた。
10	ブロック・積み木	誤飲等	女兒 2 歳	子供が 2 歳くらいの頃、小さくて細かいブロックのおもちゃを目を離した隙に飲み込んでしまった。気がついた時にはもう飲んでしまい焦ったが、後で便と一緒に出てきたので安心した。
11	ブロック・積み木	誤飲等	男児 0 歳	積み木を舐めていると思っていたら、一部かじりとって、すぐに咳き込み嘔吐した。一緒に破片も出てきて、その後は元気もよかったため受診はしなかった。
12	ブロック・積み木	ヒヤリ	男児 2 歳	上の子の片付け忘れたものが床に落ちて、同じ場所で遊ばせたら見つけて口に入れていた。
13	ミニカー	誤飲等	男児 1 歳	知らない間にミニカーのタイヤ部分のゴムが外れ、子どもが飲んでしまっていた。数日様子を見ていたところ、数日後に便と一緒に出てきた。
14	ミニカー	誤飲等	男児 0 歳	タイヤをかじっていたら、ゴムの部分が取れて飲み込んでしまった。
15	ミニカー	ヒヤリ	男児 1 歳	車のおもちゃで 1 人で遊んでいて、タイヤが外れたことに気がつかず、口をモグモグさせてたので、焦って口の中を確認したところ、食べていた。飲み込んでいなかったのも、ヒヤリだった。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
16	食べ物の形をした玩具	誤飲等	女兒 3 歳	幼稚園の秋まつりの景品でもらい、家でも遊んでいたところ、トマトのへたの部分がすぐにとれてしまい、それを口に入れていたようで飲み込んでしまったと本人から言われた。急いで救急に電話をして伝えと、本人が変わらなければ様子を見るように言われた。2 日後の排便時にへたの部分がでてきたのを確認できて一安心した。
17	食べ物の形をした玩具	ヒヤリ	女兒 2 歳	玩具の食パン（スポンジ素材で出来ている柔らかい質感の物）を本物と勘違いしたのか、一口かじったところその玩具をかみちぎってしまい、慌てて口から出させた。
18	食べ物の形をした玩具	ヒヤリ	女兒 0 歳	ちょうど、その日の朝食に星型の人参を食べた為、食べられる物だと思った様で、ままごと遊び中に人参の玩具を口に入れた。しかし、飲み込まずに直ぐに出した為、大事には至らなかった。
19	シール	誤飲等	女兒 1 歳	上の子が出していたシールをいつの間にか食べていた。飲み込んでしまって苦しそうにはしていなかったもので、そのまま様子を見た。後日、便に混じって出てきた。
20	シール	誤飲等	女兒 1 歳	貼って剥がせるシールに食べ物のイラストが書いてあり、食いしん坊の娘が口に入れて食べてしまった。
21	シール	誤飲等	男児 1 歳	おもちゃに張っていたが、おもちゃごとなめてシールが剥がれて飲み込んだが、多量ではなかったので様子を見た。
22	シール	ヒヤリ	女兒 2 歳	夏場に外出の際にベビーカーや洋服につけた虫除けのシールを剥がして口の中に入れて、舐めていた。小児救急相談に電話して、該当の製品は健康に問題がないと言われ、念のため様子見をしていました。
23	シール	ヒヤリ	男児 0 歳	ペットボトルが好きでよく噛んで遊んでいた。ラベルは外して遊ばせていたが、蓋にシールが付いていることは気付かず、遊ばせていた。遊んでいる途中で呼ぶと口に何か入っている気がして確認したところ、シールが口に入っていた。飲み込む前に気付いてよかったが、これからはシールが張り付いていないか確認してから遊ばせようと思った。
24	玩具の弾丸	誤飲等	男児 4 歳	口の中に入れて遊んでいて飲んでしまった。怒られると思って親に言わなかった。
25	玩具の弾丸	ヒヤリ	男児 1 歳	口の中で転がっていた。誤飲はしなかった。
26	シャボン玉液	誤飲等	女兒 3 歳	遊んでいて、おふざけが過ぎるようになり、シャボン玉液にストローを差してブクブクしたとき、誤って吸い込んでしまい飲んだ。
27	シャボン玉液	誤飲等	女兒 2 歳	目を離した隙に、子供が棚の上からシャボン玉液を取ったらしく、気づいた時には蓋が空いた状態で子供のそばにあった。飲んだかは不明だったが、子供に聞くと「飲んだ」と言うので、中毒 110 番に問い合わせた。その結果、具体的症状がないのであれば様子見で良い旨教えて頂き、その後も特に異変はなかったので医療機関も受診しなかった。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
28	シャボン玉液	ヒヤリ	男児 2 歳	シャボン玉で遊んでいる最中に、飲み物と勘違いし、飲みそうになったが少し口に入った時点ですぐに止めたので、病院へは行かずに大丈夫だった。
29	磁石を使った玩具 ※パズル、組立おもちゃ、釣りのおもちゃ等	ヒヤリ	女児 0 歳	ゼンマイを巻いて口がパクパクしたところを釣り竿の先端にあるマグネットをくっ付けて釣って遊ぶ玩具。上の子が遊んで片付けておらず、大人が目を離れた隙にサカナ 1 匹を口に含んでいた。隣にいた上の子が下の子の口の中を覗き込んで「何か食べてる！」と教えてくれて、そこでようやくサカナが口の中に入っていたことに気付いて取り出した。
30	その他の小型玩具 (粘土)	誤飲等	男児 1 歳	上の子供が保育園で作った作品で下の子供が遊んでいたときに、誤って舐めてしまい、粘土が緩くなっていて誤飲した。
31	その他の小型玩具 (民芸品)	誤飲等	女児 1 歳	小さいマトリョーシュカを口に入れたらハマってしまい顔が真っ赤になってこのままだと窒息すると思うも取り出せず、口の中でそっと割ったが、マトリョーシュカなので何回か割らないとならなかった。
32	その他の小型玩具 (チェーンリング)	誤飲等	男児 2 歳	仰向けでチェーンリングを触ってたら、外れて 4 連リングを飲み込んだがその場で嘔吐させ、病院に連れて行った。
33	その他の小型玩具 (粘土)	誤飲等	男児 2 歳	食玩でお寿司を作れるものがありますが、粘土でたまにお寿司を作れるキットを買ったところ、まだお菓子和粘土の区別がつかなかったのもあり、粘土をもりもり食べてしまった。
34	その他の小型玩具 (人形のパーツ)	誤飲等	男児 2 歳	上の女の子が遊んでいた人形のパーツをしまい忘れて、下の子が見つけ口に入れ飲み込んでしまった。様子を見ながら、便から出てくるのを待った。
35	その他の小型玩具 (風船)	誤飲等	男児 0 歳	1 週間便秘でやっと出たと思ったら、割れた風船が出てきた。思い返すと、自由に遊ばせていた時に咳こんで泣いた事があった。そのときに飲み込んだたようだった。
36	その他の小型玩具 (パズル)	誤飲等	女児 1 歳	上の子が 3 歳で下の子が 1 歳のとき、1 歳の女の子がすごい勢いで泣き始め、口に 3~4 枚パズルを入れ込んでいて、最初何を飲み込んだのかわからず医療機関を受診した。

(4)「洗淨剤」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

ア 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無

図 3_9 は、「洗淨剤」全体での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験を示しており、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」が 157 人 (5.2%) である。




図 3_9 「洗淨剤」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（全体）

図 3_10 は、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」との回答者 157 人に洗剤の種類について複数回答で調査した結果である。「誤飲したことがある」と「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」の合計は「食器洗い用洗剤」が 50 件（誤飲した：35 件、誤飲しそうになった：96 件）で最も多く、次に「衣料用洗剤」が 39 件（誤飲した：8 件、誤飲しそうになった：31 件）、「風呂用洗剤」が 31 件（誤飲した：3 件、誤飲しそうになった：28 件）と続いている。




図 3_10 「洗剤」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（詳細製品）

イ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況

表 3_3 は、「洗淨剤」を誤飲等した際に医療機関で受けた処置について示しており、「食器洗い用洗剤」では「胃洗淨」が「経過観察」に次いで多く、2 件である。また「食器洗い用洗剤」、「衣料用洗剤」、「漂白剤（衣類用）」では「点滴・投薬」の経験がそれぞれ 1 件ある。

	合計	経過観察	胃洗淨	点滴・投薬	血液検査	その他
(4) 洗淨剤						
食器洗い用洗剤	6	3	2	1	0	0
衣料用洗剤	2	0	1	1	0	0
トイレ用洗剤	0	0	0	0	0	0
風呂用洗剤	1	0	1	0	0	0
漂白剤（食器用）	0	0	0	0	0	0
漂白剤（衣類用）	1	0	0	1	0	0
カビ取り剤	1	0	1	0	0	0
その他の洗剤 ※排水口用洗剤等	2	2	0	0	0	0
洗淨剤【小計】	13	5	5	3	0	0

表 3_3 医療機関で受けた処置（洗淨剤）

表 3_4 は、誤飲等もしくは誤飲しそうになった「洗淨剤」の製品の形状について示している。どの洗淨剤でも「液体タイプ」が一番多い結果となったが、「食器洗い用洗剤」では「固形・錠剤タイプ」が二番目に多い。

	合計	固形・錠剤タイプ	粉末・顆粒タイプ	液体タイプ	クリーム・ジェル・ゲルタイプ	その他	わからない
(4) 洗淨剤							
食器洗い用洗剤	50	11	7	32	0	0	0
衣料用洗剤	39	3	4	24	7	0	1
トイレ用洗剤	22	3	2	14	3	0	0
風呂用洗剤	31	3	4	22	2	0	0
漂白剤（食器用）	19	4	1	14	0	0	0
漂白剤（衣類用）	15	2	2	11	0	0	0
カビ取り剤	19	7	1	10	1	0	0
その他の洗剤 ※排水口用洗剤等	12	6	3	2	0	0	1
洗淨剤【小計】	207	39	24	129	13	0	2

表 3_4 製品の形状・種類（洗淨剤）

ウ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況（詳細事例）

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
1	食器洗い用洗剤	誤飲等	女兒 2 歳	終わりがけのボトルが手の届く所にあり、ジュースと間違った。
2	食器洗い用洗剤	誤飲等	女兒 1 歳	ペットボトルに入れた洗剤を頂いた。子はペットボトルの中身が飲み物だと思い飲んでしまった。洗剤の成分がわからず、医者も困っていた。
3	食器洗い用洗剤	誤飲等	女兒 1 歳	子供用のストロー付きコップに、洗剤を吹きかけ台所に置いておいた所、手を伸ばし取り、ストローから洗剤を誤飲、不安になり受診、経過観察。
4	食器洗い用洗剤	誤飲等	男児 2 歳	目を離した隙に液体ポンプを押して飲んだ。
5	食器洗い用洗剤	ヒヤリ	女兒 2 歳	勝手に引き出しを開けて、遊んでいた。
6	食器洗い用洗剤	ヒヤリ	男児 3 歳	流しに置いてあったコップの水を飲もうとして吐き出した。つけおきをしていなかったが少し洗剤が入っていたようだった。飲まずに吐き出したし様子を見て、平気だったので医者には行かなかった。
7	衣料用洗剤	誤飲等	男児 1 歳	口に入れて、外側のフィルムがとけて中身が出た。
8	衣料用洗剤	誤飲等	女兒 1 歳	宅配から届いた段ボールをそのまま置いていたら、梱包を全て開けて、パック型の洗剤をかじってしまい、まずくて泣いていた。
9	衣料用洗剤	誤飲等	男児 1 歳	詰め替え容器に移そうと蓋を開けて置いてる間に、宅配がきて目を離していた間に飲んでいた。
10	衣料用洗剤	誤飲等	男児 1 歳	いつも家では手の届かない所に洗剤を置いているが、実家に帰った時に、たまたまパック型の洗剤が子供の手の届くところの箱に入っており、手で引っ掛けて下におとして、気づいた時にはパック型の洗剤を食べてしまっていた。すぐに気づき口の中のパック型の洗剤の液体を指で掻き出して、その後水を沢山飲ませた。夜だったので、自己対応のみで翌日まで様子見して、結局病院へは行かなかった。
11	衣料用洗剤	誤飲等	男児 1 歳	扉のロックをかけ忘れ、普段は上段に置いてあるが、詰め替えるため、その日は下に置いていたら、パック型の洗剤をかじってしまい、数分後 2 回嘔吐し、怖くなり病院に行ったが大丈夫とのこと。しかし午後になり身体中赤くなり大学病院に行き一日入院となった。
12	トイレ用洗剤	誤飲等	男児 1 歳	トイレの蓋を開けて、スタンプ式トイレ用洗剤を手ですくってなめていた。
13	トイレ用洗剤	ヒヤリ	女兒 2 歳	まだおむつをしていた頃、子供が一人でトイレを開けて中を覗いた時、スタンプ式トイレ用洗剤を指で触ってその手を舐めてしまったよう。少量だったため、うがいをさせて水を飲ませ、病院は受診していない。
14	漂白剤（食器用）	ヒヤリ	女兒 3 歳	歯磨きのコップを漂白している最中、それを知らない子供がブクブクうがいをしてしまった。変な味がすると訴え、慌てて水道水で何十回もうがいをさせた。病院の救急外来へ電話をして経緯を説明し対応の指示を仰いだ。幸い、ブクブクうがいだけで飲み込んではいなかったため、十分に水道水でうがいをし、経過観察となった。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
15	漂白剤（食器用）	ヒヤリ	女兒 2 歳	漂白している最中の所に入れて、その手を口に入れた。
16	漂白剤（衣類用）	ヒヤリ	男児 1 歳	気づいたらふたを開けていた。
17	カビ取り剤	ヒヤリ	男児 1 歳	子供が自分自身の顔に向けてかけていた。
18	その他の洗剤	誤飲等	女兒 1 歳	洗面所の排水溝に洗剤を使用し、十分な水ですすいだ後、歯ブラシを使用して掃除をし、その歯ブラシを、目を離した先に子どもが舐めてしまった。かかりつけ医に相談したところ、一応受診をということで受診をし、原液を飲んだわけではないので様子見となった。

(5) 「石鹼・化粧品等」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

ア 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無

図 3_11 は、「石鹼・化粧品等」全体での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験を示しており、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」が 258 人 (8.6%) である。




図 3_11 「石鹼・化粧品等」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（全体）

図 3_12 は、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」との回答者 258 人に石鹼・化粧品等の種類について複数回答で調査した結果である。「誤飲したことがある」と「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」の合計は「化粧品」が 124 件（誤飲した：26 件、誤飲しそうになった：98 件）で最も多く、次に「ボディシャンプー」が 82 件（誤飲した：19 件、誤飲しそうになった：63 件）、「歯磨き粉」が 74 件（誤飲した：28 件、誤飲しそうになった：46 件）と続いている。




図 3_12 「石鹼・化粧品等」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（詳細製品）

イ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況

表 3_5 は、「石鹼・化粧品等」を誤飲等した際に医療機関で受けた処置について示しており、「化粧品」では「胃洗浄」が 2 件あり、「その他の石鹼・化粧品等」では「点滴・投薬」が 2 件、「シャンプー・リンス・コンディショナー」、「入浴剤」でも「点滴・投薬」がそれぞれ 1 件あった。

	合計	経過観察	胃洗浄	点滴・投薬	血液検査	その他
(5) 石鹼・化粧品等						
化粧品 ※クリーム・化粧水・乳液・口紅等	5	3	2	0	0	0
マニキュア・マニキュア除去液	1	1	0	0	0	0
固形石鹼	2	1	1	0	0	0
ボディシャンプー	2	2	0	0	0	0
歯磨き粉	1	1	0	0	0	0
シャンプー・リンス・コンディショナー	2	1	0	1	0	0
入浴剤	2	1	0	1	0	0
その他の石鹼・化粧品等	6	4	0	2	0	0
石鹼・化粧品等【小計】	21	14	3	4	0	0

表 3_5 医療機関で受けた処置（石鹼・化粧品等）

表 3_6 は、誤飲等もしくは誤飲しそうになった「石鹼・化粧品等」の製品の形状について示している。「化粧品」では「液体タイプ」以外にも「クリーム・ジェル・ゲルタイプ」、「固形・錠剤タイプ」も多い、「入浴剤」では「固形・錠剤タイプ」と「液体タイプ」が同程度である。

	合計	固形・錠剤タイプ	粉末・顆粒タイプ	液体タイプ	クリーム・ジェル・ゲルタイプ	その他	わからない
(5) 石鹼・化粧品等							
化粧品 ※クリーム・化粧水・乳液・口紅等	124	24	13	54	29	0	4
マニキュア・マニキュア除去液	26	5	0	18	3	0	0
固形石鹼	55	52	0	0	0	0	3
ボディシャンプー	82	6	4	54	9	7	2
歯磨き粉	74	5	7	18	43	0	1
シャンプー・リンス・コンディショナー	62	3	2	49	7	0	1
入浴剤	39	13	11	13	1	0	1
その他の石鹼・化粧品等	25	8	1	11	3	1	1
石鹼・化粧品等【小計】	487	116	38	217	95	8	13

表 3_6 製品の形状・種類（石鹼・化粧品等）

ウ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況（詳細事例）

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
1	化粧品	誤飲等	男児 1 歳	顔と身体に塗ってあげていたが、顔についたものや手についたものを舐めた。
2	化粧品	誤飲等	男児 1 歳	ファンデーションの欠片が落ちていたものを、口に入れてるところをみつけ取り出した。
3	化粧品	誤飲等	男児 1 歳	風呂上がりに身体に塗るようにしているが、目を離れた隙に甘いクリームと勘違いして舐めてしまった。
4	化粧品	誤飲等	男児 2 歳	缶のボディクリームを置いておいたら、蓋を開けて少量食べてしまった。すぐに口をゆすがせたので通院まではしていない。
5	化粧品	ヒヤリ	男児 1 歳	蓋が簡単に開くものを開けていて舐めようとしていた。
6	化粧品	ヒヤリ	女児 2 歳	蓋を開けて液体を口に入れそうになった。
7	化粧品	ヒヤリ	男児 1 歳	顔に塗っていて、そのまま食べそうになっていた。
8	化粧品	ヒヤリ	女児 0 歳	引き出しを開けて口紅を取り出して、口紅のキャップを開けて自分の洋服や顔にぬっていた。
9	化粧品	ヒヤリ	男児 0 歳	手の届かない場所に置いといたが、椅子を使ってよじ登りむさぼっていた。
10	マニキュア・マニキュア除去液	誤飲等	女児 3 歳	朝方に気づくと蓋を開け舐めていた。苦いと本人から言われ気づいた。
11	マニキュア・マニキュア除去液	誤飲等	女児 0 歳	外のラベルごと丸々食べてしまっていた。
12	マニキュア・マニキュア除去液	ヒヤリ	男児 1 歳	開けられないと思って油断していたら、蓋を開けて触っていた。
13	固形石鹸	誤飲等	男児 0 歳	入浴中、体を洗っている時に、手に付いた泡をモグモグしてた。少量であり、その後変わった様子もなかった為受診はしなかった。
14	固形石鹸	誤飲等	女児 2 歳	上の子の相手をしていたら、気づいたら下の子が食べていた。
15	固形石鹸	誤飲等	女児 0 歳	お風呂で食べてた。
16	固形石鹸	ヒヤリ	女児 1 歳	洗面台の下に棚に固形石鹸を袋から出した状態のまま閉まっていたら、子どもが取り出して少しなめてしまった。
17	固形石鹸	ヒヤリ	男児 0 歳	口に入れて少しかじっていた。小児救急電話相談に電話し、問題ないと回答得たため、口の中を拭いてそのまま過ごした。
18	固形石鹸	ヒヤリ	女児 1 歳	プレゼントでいただいた石鹸が、キャンディー型のもので見た目完全に飴で、子供からしたら美味しそうに見えたらしく、気づいたら口に入れていた。すぐに味に違和感を覚えたらしく出していたが、口の中が泡立っていたし、もし飲み込んでしまっていたら、と思うと血の気がひいた。
19	固形石鹸	ヒヤリ	女児 1 歳	お風呂へ入浴時に、遊んでいて口に入れてしまった。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
20	固形石鹸	ヒヤリ	女兒 1 歳	洗面所で遊んでいたところ、目を離したすきに飲んでいました。すぐに吐き出したため、病院へ行かず家で様子をみた。
21	固形石鹸	ヒヤリ	男児 1 歳	風呂場で舐めてしまった。
22	ボディーシャンプー	誤飲等	男児 1 歳	泡状になって出くる、ポンプ式の石鹸を自分で出して、口にいていた。変な顔をしていたので注意した。
23	ボディーシャンプー	誤飲等	男児 1 歳	泡ごと飲んで大泣きした。
25	ボディーシャンプー	ヒヤリ	男児 1 歳	ボトルの出口を口に加えていた。
26	ボディーシャンプー	ヒヤリ	男児 0 歳	お風呂で息子の体を洗っていた際、ボディソープのポンプに手を伸ばし口に入れていた。
27	ボディーシャンプー	ヒヤリ	男児 0 歳	泡だらけの手を口の中へ入れていた。
28	ボディーシャンプー	ヒヤリ	男児 0 歳	泡に興味を持って口に含んだ。
29	歯磨き粉	誤飲等	男児 2 歳	子供用でフルーツ味だったのでそのまま飲みこんだ。
30	歯磨き粉	誤飲等	女兒 1 歳	自分で歯磨き粉のふたをあけて、飲んでしまった。
31	歯磨き粉	誤飲等	男児 2 歳	目を離した時に自分で取って舐めていた。
32	シャンプー・リンス・コンディショナー	誤飲等	男児 1 歳	自分でポンプをおして手に出したものを口に入れた。
33	シャンプー・リンス・コンディショナー	誤飲等	男児 1 歳	液だれしているシャンプーボトルのポンプ部分を、口に加えたことでシャンプーを少し飲み込んでしまった。口の中のシャンプーを拭ったり流したりしてから、暫く様子を見たが、体調等問題なさそうだったので受診はしなかった。
34	シャンプー・リンス・コンディショナー	ヒヤリ	女兒 1 歳	口に入れていたが大丈夫そうだったので、そのままにした。
35	入浴剤	誤飲等	男児 1 歳	お風呂に入って喉が乾くと、お風呂の水を飲む。
36	入浴剤	ヒヤリ	女兒 1 歳	お風呂に入る時にかじりそうになった。
37	その他の石鹸・化粧品等	誤飲等	男児 1 歳	夫が使っていたヘアワックスが、手の届く場所に置かれたままになっていて、朝子供が静かに洗面所でゴソゴソやっていたので見てみると、顔中ワックスだらけになっており口の中にも入っていた。すぐ口の中を洗って中毒 110 番へ電話した。
38	その他の石鹸・化粧品等	誤飲等	男児 1 歳	小さく細長いガラス瓶の香水で、見た目に興味をひかれたのか、持ちたそうにしていたので渡したところ、いつのまにか噛み砕いて中身とガラス瓶の破片を飲み込んだ。

(6)「乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

ア 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無

図 3_13 は、「乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等」全体での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験を示しており、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」が 191 人 (6.4%) である。




図 3_13 「乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験 (全体)

図 3_14 は、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」との回答者 191 人に乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等の種類について複数回答で調査した結果である。「誤飲したことがある」と「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」の合計は「乾燥剤・脱酸素剤（食品用）」が 108 件（誤飲した：13 件、誤飲しそうになった：95 件）で最も多く、次に「保冷剤」が 54 件（誤飲した：8 件、誤飲しそうになった：46 件）、「殺虫剤」が 35 件（誤飲した：1 件、誤飲しそうになった：34 件）と続いている。




図 3_14 「乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（詳細製品）

イ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況

表 3_7 は、「乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等」を誤飲等した際に医療機関で受けた処置について示している。「乾燥剤・脱酸素剤（食品用）」では「胃洗浄」が多く、3 件あり、「消臭剤・脱臭剤」でも 2 件となっている。また「衣類用防虫剤」では「血液検査」が 1 件ある。

	合計	経過観察	胃洗浄	点滴・投薬	血液検査	その他
(6) 乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等						
乾燥剤・脱酸素剤（食品用）	6	3	3	0	0	0
消臭剤・脱臭剤	5	3	2	0	0	0
衣類用防虫剤	1	0	0	0	1	0
殺虫剤 ※ホウ酸ダンゴ、蚊取りマット等、虫よけ剤も含む	0	0	0	0	0	0
保冷剤	1	1	0	0	0	0
その他の乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等 ※殺鼠剤、除草剤等	1	1	0	0	0	0
乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等【小計】	14	8	5	0	1	0

表 3_7 医療機関で受けた処置（乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等）

表 3_8 は、誤飲等もしくは誤飲しそうになった「乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等」の製品の形状について示している。「乾燥剤・脱酸素剤（食品用）」では「粉末・顆粒タイプ」が一番多いが、「固形・錠剤・カプセルタイプ」も同程度ある。また「消臭剤」、「衣料用防虫剤」、「殺虫剤」では「固形・錠剤タイプ」が一番多い結果となった。

	合計	固形・錠剤タイプ	粉末・顆粒タイプ	液体タイプ	クリーム・ジェル・ゲルタイプ	その他	わからない
(6) 乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等							
乾燥剤・脱酸素剤（食品用）	108	45	50	8	3	0	2
消臭剤・脱臭剤	34	12	4	10	6	0	2
衣類用防虫剤	29	19	3	3	4	0	0
殺虫剤 ※ホウ酸ダンゴ、蚊取りマット等、虫よけ剤等	35	19	6	3	1	4	2
保冷剤	54	12	7	6	28	0	1
その他の乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等	15	6	2	7	0	0	0
乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等【小計】	275	113	72	37	42	4	7

表 3_8 製品の形状・種類（乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等）

ウ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況（詳細事例）

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
1	乾燥剤・脱酸素剤 （食品用）	誤飲等	男児 0 歳	6 ヶ月の子どもが、自分で引き出しを開けられるようになっていて、中にあった乾燥剤を口に入れていた。口腔内の上蓋に張り付いていたのを授乳前に発見して取り出し、すぐ受診し、体内洗浄をしたところ大事には至らなかった。
2	乾燥剤・脱酸素剤 （食品用）	誤飲等	女児 4 歳	ごみ箱から拾った乾燥剤を食べた。
3	乾燥剤・脱酸素剤 （食品用）	誤飲等	男児 1 歳	マスクケースに入れていた乾燥剤を一人で部屋にいるときに小袋を破いて食べていた。
4	乾燥剤・脱酸素剤 （食品用）	誤飲等	女児 3 歳	おやつを食べさせてた時、少し離れたら袋からあけて食べていて、一緒に入っていたシリカゲルを開けて食べてしまった。
5	乾燥剤・脱酸素剤 （食品用）	ヒヤリ	男児 1 歳	袋に入っている乾燥剤、お菓子の中に入っていて、気づいたら手に取って口に入れていた。すぐに気がついてすぐに口から取り出して大丈夫だった。
6	乾燥剤・脱酸素剤 （食品用）	ヒヤリ	男児 1 歳	ふざけてハサミで、乾燥剤をあけてなめようとしていた。偶然気付いた。
7	乾燥剤・脱酸素剤 （食品用）	ヒヤリ	女児 1 歳	乾燥剤が破れており、口に入れそうになったが止めた。
8	乾燥剤・脱酸素剤 （食品用）	ヒヤリ	男児 3 歳	光るつぶつぶだ〜と言ってさっと口に含んでしまった。
9	乾燥剤・脱酸素剤 （食品用）	ヒヤリ	男児 1 歳	ビニールから出して粒を口に入れていた。
10	乾燥剤・脱酸素剤 （食品用）	ヒヤリ	女児 1 歳	袋を破って、遊んでおり、口に入れたようなかんじがした。
11	乾燥剤・脱酸素剤 （食品用）	ヒヤリ	女児 3 歳	お菓子と思って手に取っていた。
12	乾燥剤・脱酸素剤 （食品用）	ヒヤリ	女児 0 歳	お菓子等の袋に入っている乾燥剤を、大人が目を離したすきに手にとって口に入れようとしていた。口に入れる寸前だったがはっとした。
13	消臭剤・脱臭剤	ヒヤリ	女児 1 歳	テレビの後ろにおいていたが、見ていない隙に口にいれてしまった。
14	消臭剤・脱臭剤	ヒヤリ	男児 1 歳	部屋に置いてあった脱臭剤の中身が、部屋にばら撒かれていて、誤飲を疑った。
15	衣類用防虫剤	ヒヤリ	女児 1 歳	衣替えをしていて振り返ったら、子どもが空になったしょうのうの袋を持っていて、口元が白かった。慌てて救急受診したがなんともなく見間違いだったと分かった。
16	殺虫剤	誤飲等	男児 0 歳	口に入れているところを目撃し、飲み込む前に手で掻き出した。その後水を飲ませて様子を見たが、変化がなかったため自宅で様子をみた。
17	殺虫剤	ヒヤリ	女児 0 歳	床に置いておいた殺虫剤入り容器を手に持ち、舐めていたので、ヒヤリとした。
18	殺虫剤	ヒヤリ	女児 1 歳	様々な所に置いてあるので、気になって手に取ってしまう。その後口に入れてしまったので、急いで取り上げた。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
19	殺虫剤	ヒヤリ	男児 0 歳	引越しのための片付け中、放置してあった商品を手にとって口に入れようとしていた。
20	保冷剤	誤飲等	女児 3 歳	溶けて柔らかくなった保冷剤をかじって中身をちぎってしまい、そのまま口に入れてしまった。
21	保冷剤	誤飲等	女児 2 歳	歯が痒かったのか、暑かったのか忘れてしまったが、凍った保冷剤をずっとカミカミしていたのだが、気がついた時には保冷剤の中身が無くなっていた。お腹を壊したり、気分も悪そうにしていなかったなので病院には行かなかった。
22	保冷剤	誤飲等	女児 0 歳	上の子が冷やすのに使っており、もう治ったからとそのまま放置していたら、目を離した際にかじって穴を開け吸っていた。製品のホームページで誤飲した場合という欄があったので、その指示に従い水をたくさん飲ませて家で様子を見た。
23	保冷剤	誤飲等	女児 0 歳	使用後、冷凍庫に戻す前の保冷剤を噛みちぎり中のゲルが漏れていた。
24	保冷剤	誤飲等	女児 0 歳	暑い夏、凍らせていた保冷剤でひんやりさせていたが、気付いたら柔らかくなった保冷剤をかじって中身が出ていた。
25	保冷剤	ヒヤリ	女児 1 歳	床に落ちていたもので遊んでいたら、気がついたら袋が破けていた。
26	その他の乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等	誤飲等	男児	乾燥剤の袋ごと口に入れて、破けてしまってそのまま誤飲。病院に受診した時に実物を持って行き見てもらったら、消化されず数日後にうんちとして出てくる、と言われた。
27	その他の乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等	誤飲等	不明	新しい衣類を購入して開封する時に、一緒に入っていたシリカゲルを知らぬ間に床に落としていたようで、それを子供がお菓子と勘違いしたのか開けて食べていた。急いでお水をコップ一杯飲ませて対処し、様子を見て特に異常はなかったものの今後注意したいと思った。

(7)「電池」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

ア 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無

図 3_15 は、「電池」全体での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験を示しており、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」が 231 人（7.7%）である。




図 3_15 「電池」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（全体）

図 3_16 は、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」との回答者 231 人に電池の種類について調査した結果である。「誤飲したことがある」と「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」の合計は「ボタン形・コイン形電池」が 130 件（誤飲した：7 件、誤飲しそうになった：123 件）で最も多く、次に「筒形電池」が 100 件（誤飲した：2 件、誤飲しそうになった：98 件）、「平形・角形電池」が 1 件（誤飲した：0 件、誤飲しそうになった：1 件）と続く。




図 3_16 「電池」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

イ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況

図 3_17 は、誤飲等または誤飲しそうになった「電池」の形状を示しており、「ボタン形・コイン形」が一番多く、130 件（56.3%）である。次いで「筒形」が 100 件（43.3%）、「角形・平形」は 1 件（0.4%）である。




図 3_17 製品の形状・種類（電池）

図 3_18 は、誤飲等または誤飲等しそうになった「電池」の使用目的を示している。「使い終わった電池」が一番多く、74 件（32.0%）である。次いで「リモコン」が 55 件（23.8%）、「交換用に保管していた電池」が 30 件（13.0%）と続いている。




図 3_18 電池の使用目的

ウ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況（詳細事例）

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
1	電池	誤飲等	男児 4 歳	自分で玩具から取り出した使用済み電池を、口に入れて遊んでいたらしく、飲み込んでしまった。救急相談センターに電話して救急外来に問い合わせたが、コロナも流行りだしていて受け入れてもらえず、救急車を呼んで病院へ行った。内視鏡で取り出してもらった。
2	電池	誤飲等	男児 3 歳	テレビのリモコンを勝手にいじっていて、電池をとって口に入れていたので、すぐに病院に行った。
3	電池	誤飲等	女児 2 歳	捨てるために、ビニール袋に入れておいたボタン電池を口に入れてしまった。すぐに病院を受診したが、病院で口の奥にボタン電池が入っていたため、すぐにとって処置をしていただいた。
4	電池	ヒヤリ	男児 0 歳	子供のおもちゃのバッテリーを変えるために取り出したところ、赤ちゃんが即座に手に取って口に入れた。ものの数秒の出来事だった。
5	電池	ヒヤリ	男児 1 歳	リモコンに入れている電池が、リモコンの電池カバー部分が壊れており開いてしまう状態。兄が使って手の届くところに置いてあるものを持ち、電池を外してしまう。
6	電池	ヒヤリ	男児 1 歳	口に入れて遊んでいた。
7	電池	ヒヤリ	男児 0 歳	新品のボタン電池をあけて食べようとしていた。
8	電池	ヒヤリ	女児 0 歳	箱に入っていた電池を取り出して舐めていた。
9	電池	ヒヤリ	男児 1 歳	交換済みの乾電池をテーブルの上に置いておいたら、舐めて遊んでいた。
10	電池	ヒヤリ	男児 1 歳	子供の祖父が置きっぱなしにしており、気づいたら舐めていた。
11	電池	ヒヤリ	女児 1 歳	引き出しから出してきて口に入れそうになった。
12	電池	ヒヤリ	女児 1 歳	机の上に置いてしまっていたボタン電池を口に入れそうになっていた。
13	電池	ヒヤリ	男児 0 歳	使用済みの乾電池が床に落ちていて、拾って口に入れそうになった。
14	電池	ヒヤリ	女児 1 歳	破棄しようとしていたのが落ちていて、拾って口に入れていた。
15	電池	ヒヤリ	女児 1 歳	電池切れを起こして交換する際、ネジやドライバーに触らないよう注意しながら、ボタン電池をテーブルの手の届かない場所に置いたつもりが、手に届いていた。
16	電池	ヒヤリ	女児 1 歳	充電器から外して口に入れていた。
17	電池	ヒヤリ	男児 2 歳	リモコンのカバーを外し、取り出したようで、リモコンがないことで事態が発覚。電池を探したが見当たらず、子供が握って口に当てていた。
18	電池	ヒヤリ	男児 2 歳	ちょうど時計の電池を変えようとした時に、口に入れてしまい、もう少し発見が遅ければ飲み込みそうだった。
19	電池	ヒヤリ	男児 1 歳	袋に入れていたら袋をあさっていた。
20	電池	ヒヤリ	男児 1 歳	高いカウンターに置いていたが、椅子に登って手に取り電池カバーを開けて食べようとしていた。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
21	電池	ヒヤリ	男児 1 歳	2 個入っていたはずのボタン電池が 1 個になっていた。探したが見つからず、心配だったので病院でレントゲンを撮ってもらった。結果、見つからず誤飲はしていなかった。
22	電池	ヒヤリ	男児 0 歳	目を離した隙に子どもがマウスで遊んでおり、落とした衝撃でカバーが外れ乾電池が飛び出した。子どもの方を見ると、乾電池を拾って舐めようとしていたので取り上げた。
23	電池	ヒヤリ	男児 1 歳	使い終わって捨てようとして置いておいたものを、いつの間にか手に取っていて舐めていた。
24	電池	ヒヤリ	女兒 0 歳	料理中に静かだなと思ったら、自分で電池の蓋を外し、口の中に入れていた。
25	電池	ヒヤリ	女兒 2 歳	上の子が電池を交換して、そのまま机に置いてあり、それを下の子が持っていた。
26	電池	ヒヤリ	女兒 3 歳	電池を交換しようとしていたときに宅配便がきて、そのままテーブルに出していた。そのときに交換しようとしていたことを忘れてしまい、数時間放置して遊ぼうとしていた。
27	電池	ヒヤリ	女兒 1 歳	鉄道玩具を走らせて遊んでいる最中に、自分が宅配便の対応で席を離れる。戻ったら鉄道玩具のかぶせてある部分がとれて電池がなく、子どもの口に何か入っていたのですぐに出させた。恐らく鉄道玩具が転倒した際に上部が外れたか投げたりして、電池が剥き出しになったのかと思う。
28	電池	ヒヤリ	女兒 2 歳	リモコンの蓋を開けて電池をなめていた。
29	電池	ヒヤリ	女兒 1 歳	電池は電池で捨てるようにしているため、それ専用の容器があるのだが、食べ物やおもちゃと見誤ったのか飲み込みそうになった。
30	電池	ヒヤリ	男児 1 歳	デジタル式の置き時計で一人遊びしており、少し目を離した隙に電池を取り出して口に入れようとしていた。慌てて駆け寄り、電池と時計を回収した。
31	電池	ヒヤリ	男児 0 歳	電池カバーが外れて、電池が出てしまっていた。電池を口に入れようとしていたところを気がついて、口に入れる前に止めた。
32	電池	ヒヤリ	男児 1 歳	リモコンが好きで勝手に遊んでいたところ、蓋が取れて電池が出てきて口の中に含んで遊んでいた。もぐもぐしている息子に気づくことができ手を突っ込んで取ることができた。
33	電池	ヒヤリ	女兒 0 歳	リモコンが机から落ちて、はずみで電池が飛び出したことに気づかず、床をハイハイしていた子どもがなめていた。
34	電池	ヒヤリ	女兒 1 歳	電池で遊んでいることに気づくのが遅れ、完全に口のなかに入ってる状態だったので焦った。
35	電池	ヒヤリ	女兒 0 歳	電池が切れた充電機を後で充電しようと机の上に置いていたら、掴んで口に含もうとした為慌てて取り上げた。
36	電池	ヒヤリ	女兒 1 歳	電池交換の際、ネジ止めしてる間にテーブル上の使用済みの電池に手を伸ばし掴んで口に入れそうになっていた。幸い口に入れる手前で止めることができたが、ひやりとした。

(8)「その他家庭用品」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

ア 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無

図 3_19 は、「その他家庭用品」全体での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験を示しており、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」が 747 人 (24.9%) である。




図 3_19 「その他家庭用品」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（全体）

図 3_20 は、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」との回答者 747 人にその他家庭用品の種類について複数回答で調査した結果である。「誤飲したことがある」と「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」の合計は「紙」が 528 件（誤飲した：229 件、誤飲しそうになった：299 件）で最も多く、次に「ペットボトルの蓋」が 283 件（誤飲した：6 件、誤飲しそうになった：277 件）、「ビニール袋」が 210 件（誤飲した：44 件、誤飲しそうになった：166 件）と続いている。




図 3_20 「その他家庭用品」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（詳細製品）

イ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況（詳細事例）

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
1	硬貨	誤飲等	女兒 2 歳	お財布の中の硬貨をなめていて、ジャンプした拍子に飲み込み、顔が赤くなりくるしそうにしていたので救急車を呼んだ。
2	硬貨	誤飲等	女兒 3 歳	拾った 1 円玉を持ち帰り、家で洗って持たせていたところ、飲み込んだと娘からの報告で誤飲を確認。小児救急電話相談に電話をして対応確認をした後、救急車を呼んで医療機関を受診した。
3	硬貨	ヒヤリ	女兒 0 歳	テーブルの上のお財布を引っ張って落として、小銭入れから、小銭を出して口に入れたり出したりしていた。硬貨が大きかったので、誤飲にはつながらなかった。
4	磁気治療器	ヒヤリ	男児 0 歳	引き出しの中に入れておいた物を、取り出して飴のように口に入れていた。危うく飲み込むところだった。
5	磁石	ヒヤリ	女兒 0 歳	壊れて取れかけていたので遊んでいた。口に入れたのではないかと思い、焦ったが口には入れていなかった。
6	紙	誤飲等	女兒 0 歳	上の子がお絵かきをしていて、落としていたページに気づかずいたら、取られて飲んでいた。
7	紙	誤飲等	女兒 0 歳	目を離した隙にティッシュを食べていた。喉に張り付き呼吸がしづらくなり、咳き込んでいた。
8	紙	誤飲等	男児 0 歳	別室で寝ていたら、気付かないうちにこどもが起きていて、移動していた。気づいたら説明書の紙を半分以上食べていた。他にも周りに物があつたので、他のものも飲み込んでないか心配になり、病院へ行った。
9	紙	誤飲等	女兒 0 歳	カプセルおもちゃの一部品。片面がビニールコーティングされている縦横 1 センチくらいの紙を指で摘んで口に入れていた。静かだったので気付かず。見たら嘔吐をしていた。抱っこをすると泣いて苦しそうにしていたので背中をさすると更に嘔吐。嘔吐物から紙が出てきて、そこで初めて誤飲に気付いた。
10	紙	誤飲等	男児 0 歳	絵本のページを破って飲み込んでいた。目を離した隙だったので、絵本のページが欠けているのに気がついて、口の中に破片が残っていた。排泄物に混ざって出て来たので受診しなかった。
11	紙	誤飲等	男児 0 歳	赤ちゃん教室でシールを張る作業をしていたらシール台である画用紙を誤飲していた。飲み込んだ量がすくなかったうえ体調もわるそうではなかったので様子見した。
12	ペットボトルの蓋	ヒヤリ	男児 2 歳	ペットボトルを使った工作で遊んでいるときに、蓋が口に入りそうでヒヤリとした。
13	ペットボトルの蓋	ヒヤリ	女兒 1 歳	閉まっていると思っていた蓋が、しっかりと閉まっていなくて、ペットボトルで遊んでいるときに口に残ってしまった。出してと言っても、はじめはふざけて出そうとしなかったが、自分で吐き出してくれた。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
14	ペットボトルの蓋	ヒヤリ	男児 0 歳	ペットボトルと蓋は専用のゴミ袋に入れているが、穴が空いて、蓋が飛び出していた。手に持って、口に運ぼうとしている時に音で気がついた。
15	ペットボトルの蓋	ヒヤリ	女児 1 歳	ペットボトルの飲み物を母が飲もうとして、蓋を机の上に置いておいたら気付かれて、気付いた時には口の中に入れてしまっていました。飲み込んではいないが、ヒヤヒヤした。
16	アクセサリ	誤飲等	男児 3 歳	指輪をテーブルの上に置いておき、少し目を離れた隙に飲み込んでしまったようで病院に行った。特に治療などはせず、便と一緒に出てくるのを待つことになり、後日無事に便とともに指輪がでてきた。小さなものは手の届くところには置いてはいけなかった。
17	アクセサリ	ヒヤリ	男児 1 歳	髪を縛っていたゴムを自分でとって口に入れてしまった。そばにいたのですぐ気づくことができて、すぐ口から出した。
18	ケーキの飾り	ヒヤリ	男児 0 歳	大人用のお菓子の飾りをふと気づくと口に咥えていた。
19	ケーキの飾り	ヒヤリ	男児 3 歳	チョコと勘違いをしてロウソクを噛み砕いていた。
20	ビニール袋	誤飲等	女児 1 歳	パッケージのビニールをとった後、おいてあったものを口に入れていて、飲み込んでしまった。その後しばらく泣いており、声が少しおかしかったので、気管の方に入ってしまったのかと思い、相談救急センターに相談したところ、救急車を手配してくれ、救急病院を受診し、問題ないことを確認した。
21	ビニール袋	誤飲等	女児 1 歳	落ちていたお菓子が入っていた袋の一部(1cm 弱)を飲み込んだところ、喉に張り付き、チアノーゼを起こしていた。背中を叩くのと、指を入れ嘔吐させ事なきを得たが、念のため、医療相談に電話をし、今後の様子見となった。
22	ビニール袋	誤飲等	男児 0 歳	菓子を食べさせた時に菓子の袋をかじっていて、気がつくと袋の切れ端の一部が見当たらなくなっていた。後日便と一緒に出てきて誤飲したのがわかった。
23	ビニール袋	誤飲等	男児 0 歳	袋で音を出して遊んでいて、渡したときに袋に切り取れる部分があり、それが口に入って飲み込んでしまった。
24	ビニール袋	誤飲等	男児 0 歳	綿棒ケースのフィルムを剥がし、一部飲み込んでしまった。その後嘔吐が続き病院を受診。ただ、受診時は回復傾向が見られたため処置は行わず自宅で様子見となった。
25	水を含むと膨らむ製品	誤飲等	男児 0 歳	ちぎれたスポンジを食べてしまった。
26	その他の家庭用品	誤飲等	女児 6 歳	気づいたら滑り止めを飲んでいて。
27	その他の家庭用品	誤飲等	女児 1 歳	クリップがうんちとともにでて来て誤飲したことを知った。
28	その他の家庭用品	誤飲等	男児 3 歳	リモコンを舐めて、ゴムのボタンを噛みちぎり飲み込んだ。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
29	その他の家庭用品	誤飲等	男児 1 歳	ゲームのコントローラーのシリコン部分を紛失していて、直前に息子が触っていたので誤飲等したのだと思った。2 日後排便時に一緒に出てきた。
30	その他の家庭用品	誤飲等	女児 0 歳	輪ゴムを飲み込んで喉の奥でゴキュンゴキュンと音を立てていた。
31	その他の家庭用品	誤飲等	男児 0 歳	小さい屑が落ちているのを拾って口にした。咳が止まらなくなり救急車を呼んだが、搬送する前に取れた。
32	その他の家庭用品	誤飲等	男児 0 歳	コードレスイヤホンを充電していたため、床にイヤホンが置いてあった。気づいたら子供が口にイヤホンを咥えており、片耳のシリコンの部分がなくなっていたため、誤飲したと判断。病院へ連れて行ったが、普段と様子も変わらず、激しくむせたりもしていないことから胃に落ちていると思うとのことで様子を見たところ、次の日にうんちと一緒に出てきた。
33	その他の家庭用品	ヒヤリ	女児 1 歳	キッチンワゴンの棚のネジは、取り外しがしやすいように、元々ネジが固定されていないタイプの物だった。子どもの小さい手では簡単に取り外しが出来、キラキラしているためか口に入れて遊んだりする事があった。口の中でモゴモゴしているのでネジを口に入れたのだと気づき、慌てて『お口から出して』と言ったが、かえって子どもをびっくりさせてしまいネジを飲み込んでしまいそうになった。
34	その他の家庭用品	ヒヤリ	男児 0 歳	コロコロする粘着シートのロール状の部分を、舐めまわし噛みちぎりそうになった。
35	その他の家庭用品	ヒヤリ	男児 0 歳	ジョイントマットを自分で剥がし、接続部分を噛みちぎって舐めていた。気付いて口の中に手を入れて取り出したがヒヤッとした。
36	その他の家庭用品	ヒヤリ	男児 0 歳	デスクの上に置いていた万年筆を舐めていた。既に蓋が外れていたためインクの漏れが心配だったが、口に付いていなかったため取り上げただけで終わった。
37	その他の家庭用品	ヒヤリ	女児 0 歳	絵本に貼ってあったセロハンテープを自分で剥がして口に入れていた。
38	その他の家庭用品	ヒヤリ	女児 0 歳	取れかけていたボタンについた紐で遊んでいて、ボタンが口の中に入っていることに気づいた。

(9) 「食品」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

ア 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無

図 3_21 は、「食品」全体での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験を示しており、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」が 981 人 (32.7%) である。




図 3_21 「食品」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験 (全体)

図 3_22 は、「食品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」との回答者 981 人に食品の種類について複数回答で調査した結果である。「誤飲したことがある」と「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」の合計は「飴」が 413 件（誤飲した：127 件、誤飲しそうになった：286 件）で最も多く、次に「パン」が 315 件（誤飲した：50 件、誤飲しそうになった：265 件）、「果物」が 216 件（誤飲した：49 件、誤飲しそうになった：167 件）と続いている。




図 3_22 「食品」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（詳細製品）

イ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況（詳細事例）

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
1	飴	誤飲等	男児 5 歳	飴を口に入れて直後に、牛乳を飲み、苦しそうに泣いた。背中を叩いたが飴は出てこなかった。救急車を呼び、受診したが、飴を飲み込むことができ、大事に至らなかった。
2	飴	誤飲等	男児 4 歳	飴が気管に入って苦しそうにしていた所を発見し、背中をタッピングしたところ吐き出した。その後、変わらなかった為受診はしなかった。
3	飴	誤飲等	男児 2 歳	2 歳の息子が飴を舐めていたところ、ふとした拍子で飲み込んでしまった。本人も痛かったようで少し泣いたが、幸い喉を通過できていたため、その後水を飲ませて落ち着いて、大事には至らなかった。
4	飴	ヒヤリ	男児 3 歳	個包装の丸くてコロンとしているのを口に入れたまま歩いてつまづき、誤飲しかけた。背中を叩いたら出たので様子見だったが、子どもは怖くて泣いていた。
5	パン	誤飲等	男児 1 歳	普通に食べていたが、大きいまま飲み込んでしまったようで、息がくぐもって聞こえたので急いで背中を叩いて出した。
6	パン	誤飲等	男児 1 歳	パンを少しづつ食べられるようになり、美味しかったのか、大きな塊をそのまま口へ入れてしまい、喉につかえて泣き出したので背中を叩いて取り出した。
7	ベビー用のせんべい・ビスケット	ヒヤリ	女児 0 歳	口に入れて溶ける前に飲み込もうとしたらしく、喉にひっかかって背中を叩いたりしたが取れず、口の中に指を無理矢理入れてなんとか取り除いた。
8	ベビー用のせんべい・ビスケット	ヒヤリ	男児 0 歳	食べた時に変なところに入ってしまったが、戻した勢いで出てきて一安心した。結局、病院には行かなかった。
9	ゼリー（こんにやく入りゼリー以外）	ヒヤリ	男児 1 歳	凍らせたゼリーを一気に口に入れてしまい、つまらせた。背中を叩いたりしたら吐き出せたので、病院には行かなかった。
10	ゼリー（こんにやく入りゼリー以外）	ヒヤリ	男児 3 歳	続けて 3 個与えたら詰まらせた。顔色が悪くなったので背中を叩いて吐かせた。
11	こんにやく入りゼリー	誤飲等	女児 1 歳	喉を詰まらせたが、飲み込んでヒヤリとしたが、なんともなく受診しなかった。
12	こんにやく入りゼリー	ヒヤリ	男児 5 歳	通常のゼリー感覚で食そうとしたが、喉元で詰まったらしく様子が変わり、数秒後に自力で吐き戻した。
13	ご飯（米）	誤飲等	男児 2 歳	当時白米が大好きすぎて、しっかり嚙んで飲み込む前に次の一口を口に入れてしまう傾向があり、飲み込める許容量を超えてしまい、喉に詰まらせた。すぐに背中を叩いたのと、自分で吐き出して大事には至らなかった。
14	ご飯（米）	誤飲等	女児 3 歳	たくさん口の中にいれて飲み込もうとしたため、全部が飲みきれずに途中で止まってしまう苦しんでいたの、指をいれて少しご飯をかきだしたら、そのあと残りを吐いて大丈夫だった。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
15	ご飯（米）	誤飲等	男児 1 歳	おにぎりにして食べさせていたが、子供がつかんでいた米をすべて口にいれ、喉に詰まらせてしまい、背中を叩いて吐き出させようとした。なんとか飲み込んだので、すぐにお茶を飲ませた。
16	ご飯（米）	ヒヤリ	男児 1 歳	ご飯をたべながら部屋をあるいていた。その後つまづきその時にご飯が喉に詰まり息ができず全部吐いた。
17	餅	ヒヤリ	女児 6 歳	今年の正月に同居する祖父母も交えてお雑煮を食べ、年始のあいさつをした。6 歳女児が餅を早食いしたのか、喉につかえそうになっていた。
18	果物	誤飲等	男児 1 歳	小さめに切ったリンゴを噛まずに飲み込んだため、喉に詰まらせた。吐き出させたが喉の痛みがあると訴えるので医療機関を受診した。
19	果物	誤飲等	男児 1 歳	一瞬のどに引っかかって、苦しそうにしていた。でも、すぐに手を口に突っ込み、舌を下に下げたらりんごがぼろっと出てきたので病院には行かなかった。
20	果物	誤飲等	女児 3 歳	食後のデザートで果物を口に入れたまま遊んでいた。気づいたら苦しそうにしていた。
21	果物	ヒヤリ	男児 1 歳	いちごの形を見せようと切らずにそのまま手に持たせたら、口の中に入れてしまい飲み込める大きさではなかったのですぐ口から出したが少しヒヤッとした。
22	果物	ヒヤリ	男児 0 歳	くし切りにカットしたりんごの果汁を吸わせていたが、歯茎で噛みちぎり飲み込もうとした。まだ歯が生えていなかったため油断していた。
23	その他の食品 （イカ）	誤飲等	男児 4 歳	イカの刺身の筋が噛み切れず、口の中と食道に繋がった状態になり、飲み込めずに苦しんだ。すぐに口の中のイカを引っ張りすべて取り出した。
24	その他の食品 （魚の骨）	誤飲等	男児 2 歳	夜ご飯に出した焼き魚の骨が取りきれなかったようで、喉に刺さってしまった。泣きながら数回嘔吐し、血も混じっていた。どうして良いかわからず救急病院に連絡をした。翌日朝一で病院に行って取ってもらった。
25	その他の食品 （魚の骨）	誤飲等	男児 5 歳	5 歳の息子はこれまで魚の骨を誤飲してこなかった油断から、骨抜きせずに食べさせたら、誤飲した。
26	その他の食品 （乳製品）	誤飲等	男児 3 歳	丸いチーズを舐めたいに口に置いてなめて食べていたが、飲み込んでしまい、詰まった。逆さまにして、背中を叩いて、吐き出させた。
27	その他の食品 （野菜）	誤飲等	男児 1 歳	まだ歯が 2～3 本しか生えておらず噛めないだろうと短い棒状のまま持たせて抱っこしていたらむせ込んだ。見るときゅうりが折れて詰まってチアノーゼをおこしていた。背中を叩き吐きださせた。
28	その他の食品 （野菜）	誤飲等	女児 1 歳	離乳食で出した茹でた人参スティックを、丸呑みしてしまった。口に手を突っ込んで引き出した。
29	その他の食品 （海苔）	誤飲等	女児 2 歳	小さいおにぎりを海苔で巻いて出したが、うまく噛みちぎれずに飲み込んでしまったようで、一時的に喉が詰まってしまう、背中を叩いて口から取り出した。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
30	その他の食品 (お菓子)	誤飲等	男児 1 歳	グミの入った袋をテーブルに置いていた。おしゃべりな息子が突然おとなしくなり家族が異変にきづいた。顔を真っ赤にしていた。グミの袋のチャックが開いていたため、飲みこんだのだと判断し、体を逆さに抱き上げて喉がまっすぐになるように顔を上げさせて背中をたたいた。昔のやり方だが、グミがコロンと出てきた。
31	その他の食品 (氷)	誤飲等	女児 3 歳	真夏の公園にて、ストローではない水筒に氷いりのお茶を飲み、氷を飲み込んでしまい、みるみる青ざめた。
32	その他の食品 (肉)	誤飲等	男児 0 歳	肉を噛みきれなくて塊を飲み込んでしまい、窒息しかけたので背中を叩いた。
33	その他の食品 (麺類)	誤飲等	男児 2 歳	それまではハサミで麺類を切って与えていましたが、だいぶ上手に食べられるようになったので、あまり細かく刻まなかった所、ロー杯にラーメンを含み、飲み込めなくなり、喉の辺りでラーメンがつかえてしまい、呼吸が上手くできなくなりそうだったので、体を斜め下に向かせにし吐き出させた。
34	その他の食品 (こんにゃく)	ヒヤリ	女児 4 歳	糸こんにゃくを思った以上に口の中に多く入ってしまったため嗚咽した。背中をたたいていると症状が緩和された。
35	その他の食品 (麺類)	ヒヤリ	男児 1 歳	うどんをうまく噛むことができず、のどの奥に引っかかり、口から引っ張り出した。
36	その他の食品 (野菜)	ヒヤリ	女児 2 歳	小さめに切ったつもりでも野菜の繊維が飲み込めずにいた。
37	その他の食品 (野菜)	ヒヤリ	男児 1 歳	煮たカボチャを細かくして与えていたが、目を離れたすきに堅い部分を手づかみで口に入れ、飲み込みそうになった。
38	その他の食品 (お菓子)	ヒヤリ	女児 3 歳	子供に大きめタブレット状のラムネ菓子を渡して食べさせていて、突然泣きながらむせた。詰まることはなかったが、ゴホゴホしながら苦しそうにして、少ししたら落ち着いた。
39	その他の食品 (海苔)	ヒヤリ	女児 2 歳	おにぎりを食べた際に、海苔だけをちぎって口に入れ、上顎に引っ付いて苦しそうにしていたが、指を突っ込んで剥がしとった。
40	その他の食品 (海苔)	ヒヤリ	女児 2 歳	おにぎりに巻いてあった海苔を外してそのまま丸のみしてしまい、喉につかえそうになった。
41	その他の食品 (海苔)	ヒヤリ	女児 3 歳	海苔が好きなので、いつもより大きめの海苔を渡したところ一気に食べてしまった。海苔が大きかったのか喉に張り付いてしまったのか、呼吸が苦しそうになったがお茶を飲ませたところ落ち着いた。それ以来、今も小さめにしている。

(10) 「その他（食品）」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験

ア 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の有無

図 3_23 は、「その他（食品）」全体での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験を示しており、「製品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」が 236 人（7.9%）である。




図 3_23 「その他（食品）」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（全体）

図 3_24 は、「その他食品を所有しており、誤飲したことや誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」との回答者 236 人にその他食品の種類について複数回答で調査した結果である。「誤飲したことがある」と「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」の合計は「酒類」が 110 件（誤飲した：30 件、誤飲しそうになった：80 件）で最も多く、次に「アルコールを含む食品」が 55 件（誤飲した：8 件、誤飲しそうになった：47 件）、「しょうゆ」が 45 件（誤飲した：6 件、誤飲しそうになった：39 件）と続いている。




図 3_24 「その他（食品）」での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験（詳細製品）

イ 誤飲等及びヒヤリ・ハット経験時の状況（詳細事例）

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
1	酒類 ※ビール等	誤飲等	男児 5 歳	パックの日本酒だったので、いつも与えているパックのジュースと間違えて誤飲。カップにビールを入れて飲んでいたら、目を放したすきに、泡がなくなったビールを麦茶と間違えて誤飲。
2	酒類 ※ビール等	誤飲等	男児 4 歳	ジュースと間違えて飲んでしまった。
3	酒類 ※ビール等	誤飲等	男児 0 歳	お酒のパックで遊んでおり、目離した隙にパックが開いており床に溢れたお酒手でピチャピチャ遊んでいたもので、舐めてしまった可能性がある。
4	酒類 ※ビール等	誤飲等	男児 1 歳	食事中、目を放した隙に開封済みの缶ビールを飲まれていた。急いで水を大量に飲ませた。その後、特に異常は起きてないので病院には行ってない。
5	酒類 ※ビール等	誤飲等	男児 0 歳	薬を飲ませようと、粉薬を溶く際に、ビールの入ったコップからすくってしまい、そのまま口へ運んでしまった。
6	酒類 ※ビール等	誤飲等	女児 0 歳	自分が晩酌で飲んでいて物を、目を離した隙にその中に手を入れて舐めていた。その後様子を見たが変わった様子はなかったので医療機関は受診しなかった。
7	酒類 ※ビール等	誤飲等	女児 1 歳	パーティー会場でのケータリング業者に、子供の水筒の水がなくなったので水の補充を頼んだら、ラベルのない大きなペットボトルから透明な液体を補充してもらった。その後何度か水筒から飲ませたら嫌な顔をしながらも飲んだ。匂いをかいだら水ではなく焼酎であることに気づいた。
8	酒類 ※ビール等	誤飲等	女児 6 歳	ジュースと間違えて缶のまま一口だけ飲んでしまった。
9	酒類 ※ビール等	誤飲等	男児 1 歳	置いておいたロックのウィスキーを誤飲してしまい、酔って挙動不審になった。その後、様子見して病院行くか検討したが、大丈夫そうだった。
10	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	男児 4 歳	子供と同じコップにビールを入れていたが、子供のルイボスティと同色なので間違えそうになった。
11	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	女児 2 歳	飲みかけの缶をテーブルに置いてたものを、子どもが口につけそうになったところで気がついて止めた。誤飲はしなかった。
12	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	男児 1 歳	夫がお酒を飲んだあと、置きっぱなしにしていたらコップを持って飲もうとした。
13	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	女児 4 歳	親の白ワインと、子供用の冷たいトウモロコシ茶をそれぞれ異なるグラスに入れてテーブルに置いておき、親が一瞬目を離したところ、ワインを誤飲しそうになって、直前で止めた。
14	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	男児 1 歳	飲みかけのものをテーブルの上に置いており、机の上に手を伸ばし取っていた。本人は飲もうとして口元まで持っていき、ヒヤッとした。
15	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	女児 2 歳	夫が湯呑み茶碗で焼酎を飲んで置いたままにしておいたところ、お水かと思って飲もうとした。なんとか未遂で終わりホッとした。
16	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	女児 4 歳	飲みかけをテーブルに置いておいたところ、ジュースかと思い飲もうとしていて寸前で止めた。

No.	製品詳細	誤飲等/ ヒヤリ	性別・年齢	内容
17	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	女兒 1 歳	机に置いてあるものを飲もうとした。
18	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	男児 2 歳	バーベキューで複数人がアルコールを飲んでいて、テーブルや椅子に置いてあったのを触ろうとした。
19	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	男児 3 歳	麦茶割を作ったら、普通の麦茶として飲みそうになった。
20	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	女兒 1 歳	私が夜ご飯と一緒に飲んでいたお酒のコップをそのままテーブルに置いていて、娘が食事後に手を伸ばして飲む動作をしたので、飲み干していたものの、もしかしたら少し飲んでしまったかもしれないと、ヒヤッとした。
21	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	男児 2 歳	手の届く場所にあったため、間違えて飲みそうになっていた。
22	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	女兒 1 歳	水と間違えて手にとろうとしたが、すぐに近くにいた大人が気が付き手に届かない場所に移動した。
23	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	女兒 2 歳	飲んでいい？といいながらグラスを抱えた。
24	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	女兒 4 歳	同じ食卓で大人が飲んでいて、娘が自分のものと思い込み飲みそうになった。
25	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	男児 4 歳	泡が気になって誤飲しそうになった。
26	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	男児 2 歳	帰省した先で夕食時に酒が振る舞われ、子供のそばでは飲まないよう気を付けていたが、ふとした拍子にお猪口を手近なテーブルに置き、一瞬目を離して振り返ったら、子供がそれを手に取ろうとしていて驚いた。
27	酒類 ※ビール等	ヒヤリ	男児 0 歳	ぐずるので子供を膝に乗せて飲酒してたら、手を出してコップに口をつけようとした。
28	しょうゆ	誤飲等	女兒 3 歳	しょうゆさしに移し替えた後、蓋をするのを忘れてしまい、娘が誤飲した。小さいしょうゆさしの半分くらいだったので、様子を見て事なきを得た。
29	しょうゆ	誤飲等	女兒 2 歳	刺身用しょうゆ皿に入っていたしょうゆを飲んだが、少量だったので受診していない。
30	しょうゆ	ヒヤリ	男児 1 歳	棚の低い段にあるので手に届いてしまい、飲みそうになった。しかし、容器が重いためうまく掴めず飲むことはなかった。
31	しょうゆ	ヒヤリ	男児 1 歳	しょうゆ瓶に口をつけて飲みそうになった。
32	アルコールを含む食品	ヒヤリ	男児 3 歳	アルコールが入ったケーキを誤って出してしまった。私も同時に食べて気がついたため、すぐにさせたが、ヒヤリとした。
33	健康食品・健康補助食品 ※サプリメント等	ヒヤリ	女兒 1 歳	サプリメントを卓上に置いて席を離れたが、子供は食事中でそのサプリメントに手を伸ばし食べそうになった。
34	健康食品・健康補助食品 ※サプリメント等	ヒヤリ	女兒 1 歳	ソフトカプセル型のサプリメントを机上におき食事を終えた後、食器を洗っている間に口にいていた。幸いカプセル外装のゼラチン部分は口腔内で溶解しておらず外に出すことが出来たため大事に至らなかった。
35	健康食品・健康補助食品 ※サプリメント等	ヒヤリ	女兒 2 歳	テーブルに置いていた物を目を離した隙に口に入れて遊んでいた。飲み込んではいないので自宅で様子を見た。

4. 乳幼児の誤飲等で特に危険と思う製品

図 4_1 は、回答者 3000 人に「誤飲等」の有無にかかわらず「乳幼児の誤飲で特に危険と思う製品」について、10 項目の製品・食品から選択してもらった内容を示したものである。

10 項目の製品・食品の内、たばこと回答した人が 877 人（29.2%）で、全体の約 3 割であった。続いて、電池が 678 人（22.6%）で玩具が 531 人（17.7%）となっている。




図 4_1 乳幼児の誤飲等で特に危険と思う製品

5. 誤飲等を防ぐために気をつけていることや工夫

(1) 誤飲等を防ぐために気をつけていること

図 5_1 は、誤飲等を防ぐために気をつけていることを複数回答で調査した。

「子供の手の届くところに小さいものを置かない」は 2,631 人 (87.7%) が回答している。続いて「子供から目を離さない」は 1,812 人 (60.4%)、「こまめに整理整頓・掃除をし、小さなものが落ちていないか確認する」が 1,698 人 (56.6%) となっている。




図 5_1 誤飲等を防ぐために気をつけていること

(2) 誤飲等を防ぐための工夫（概要）

誤飲等を防ぐための工夫を自由記述で質問した結果、2,295 人の回答を得た。

図 5_2 は、誤飲等を防ぐための工夫について選択肢形式で質問した結果を示している。

「危険なものを置かない・片づける」は 2,085 人（90.8%）が回答している。続いて「子供から目を離さない・一人にしない」は 151 人（6.6%）、「安全な環境を作る・安全に配慮された製品を使う」が 146 人（6.4%）となっている。




図 5_2 誤飲等を防ぐための工夫

(3) 誤飲等を防ぐための工夫（詳細事例）

危険なものを置かない・片づける	
1	手の届かないところに置く。
2	物を置かない。
3	戸棚や引き出しにしまう。
4	目につかないところにしまう。
5	開けられない蓋が付いたものに保管する。
6	こまかい玩具は個数を確認し片づけている。
7	こまめに掃除する。
8	遊んだらすぐに片づける。
9	物を出しっぱなしにしない。
10	小さい玩具は、片付けのたびに個数を数えて揃っていることを確認する。
11	危険なものはすぐに捨てる。
12	誤飲しそうなものは破棄する（所有しない）。
13	ボタン電池などはあらかじめ外しておく。
14	たばこの吸い殻などは袋に入れ、ゴミ箱の奥に押し込む。
15	たばこ専用のごみ箱をつくり、子供が使うものと別にしている。
子供から目を離さない・一人にしない	
1	目を離さない。
2	目の届くところで遊ばせる。
3	一人にしない。
4	親のどちらかがいるようにしている。
5	小さい玩具は一緒に遊ぶようにしている。
6	お菓子は親の前で食べさせる。
7	スマホなどしながら子供と遊ばない。
8	常に子供が何をしてるか口に何か入っていないか気にしている。
9	子供の様子を常に見ながら過ごすようにしている。
10	子どもが目の届かない場所にいる時ははっきりと声をかけたり様子を見に行く。
安全な環境を作る・安全に配慮された製品を使う	
1	鍵・チャイルドロックを取り付ける。
2	ベビーゲート・ベビーサークルで子供にとって安全なスペースをつくる。
3	大人の使うものと、子供の使うものを分けて置いている。
4	たばこをやめる・家の中で吸わない。
5	ペットボトルで遊びたいときは外装のビニールを外す。

6	おしゃぶりを無理に外させたりしない。
7	リビングには物が増えないように棚など置かない。
8	洗剤はパック型の洗剤をやめた。
9	成長に合わせて置く場所や置くものを変える。
10	対象年齢を守って玩具を用意する。
11	お酒とお茶はデザインが全く異なるグラスに入れるようにしている。
12	使い終わった食器などに洗剤を入れておかない。
13	ボタン電池を使っているものは基本的に使わない。
14	玩具の電池などはネジをキツくしめている。
15	お風呂のドアには常に鍵をかけて入れないようにする。
危ないものや行動を子供に伝える	
1	小さな物を口に入れないことを何度も言うようにしている。
2	食べ物を食べているときは動かないよう注意している。
3	なんでも口に入れてはダメと伝える。
4	危ない物やなぜ危ないかを教えている。
5	ここに入っている物は触ってはダメと、エリアで伝えている。
6	大きくなってきたので、絶対に口に入れないと約束をする。
7	よく嚙んでから食べるよう声をかける。
8	シャンプーなどの容器に食べるなど書いてある。
9	食べ物でないものを口に入れて遊ぶと、死んじゃうよ！と怖がらせる。
10	上の子には遊んだあと片付けるように話す。
11	何か見つけたらママに持ってくるように教えている。
誤飲しそうな小さなものは与えない・買わない	
1	小さな玩具は買わない。
2	小さい玩具は与えない。
3	小さい部品のないものを買う。
4	食べ物は細かくして出す。
5	一口ゼリーは与えない。
6	豆類は買わない。
7	薬に似ているお菓子(ラムネやあめなど)は与えない。
8	小さな玩具は大きくなるまで、取っておく。
9	飴玉はつまらせない小さなサイズのものしか買わない。
10	一度でも口に入れた玩具は処分している。

遊べる時間や場所を決める	
1	上の子には細かい玩具で遊ぶ時は、下の子の手が届かないところでやるよう話している。
2	飴を食べる時は勝手に食べず、座って食べるなどルールを守って食べさせている。
3	上の子と玩具の広げるスペースを分けていた。
4	共有スペースにはものを出したままにせず、各々の指定しているスペースの物は触ってはいけないというルールにしている。
5	上の子の小さい玩具は大人の目があるときにしか遊べないルールにしている。
6	兄達がビー玉を使うときは個数を決めて、定期的に個数が手元に足りているか確認している。

6. 誤飲等をした時の応急処置の方法

図 6_1 は、誤飲等をした時の応急処置の方法について、認知の割合を示している。「講習を受けて知っている」と回答した人が 429 人（14.3%）、「講習を受けて無いが知っている」と回答した人が 1,072 人（35.7%）で知っている人を合計すると全体の 5 割である。




図 6_1 誤飲等をした時の応急処置の方法の認知

図 6_2 は、誤飲等をした時の応急処置の方法について、性別毎の認知の結果を示している。「講習を受けて知っている」と回答した人は、男性 122 人、女性 307 人である。




図 6_2 誤飲等をした時の応急処置の方法（性別毎）

図 6_3 は、誤飲等をした時の応急処置の方法について、性別年代別の認知の割合を示している。性別年代別の「講習を受けて知っている」と「講習を受けて無いが知っている」の合計の割合が一番高いのが男性 20 代（62.7%）で、一番低いのが男性 50 代（34.0%）である。




図 6_3 誤飲等をした時の応急処置の方法（性別年代別）

7. その他の自由記述のまとめ

(1) その他自由記述のまとめ（概要）

今回の調査において、誤飲等の「有無」にかかわらず、回答者 3000 人に「誤飲について、その他身の回りの製品で危険を感じたり、ヒヤリ・ハットした事例について教えてください」と自由記述で質問した結果、763 人から回答を得た。

「その他家庭用品」の事例が 283 件と最も多く、「玩具」が 153 件と続く。その中で、誤飲ではないが鼻や耳に入れる事例が 18 件あった。また、家の中だけでなく外出時に落ちている物を口に入れる事例が 32 件あった。

自由記述のまとめ（事例抜粋）

たばこ	
1	加熱式たばこの吸い殻を、子供が真似してくわえていた。
2	たばこの灰皿をいたずらして、吸い殻などを口に入れた。
医薬品	
1	親の常備薬を入れているポーチのスナップボタンを開けられるようになっていて、中にあった錠剤を手にとっていた。
2	飲み薬を救急箱から出して封を開けていた。
3	薬のクリームをなめていた。
4	皮膚炎の軟膏薬を嚙んで中身が出ており、おそらく口に入っていた。すぐに水で洗い流した。
5	大人が飲む薬を出した時に勢いで床に落ち、どこに行ったかわからなくなった。すぐに子供を別の部屋に待避させ、いろいろなものをどかして探し出した。
6	おばあちゃん達の部屋の下に置くタイプのゴミ箱の中から、薬のゴミを出してきて遊んでいた。
7	シロップの薬を飲む小さな計量カップを口に入れて、のどにぴったりはまってしまって、空気圧がかかって取れなかった時はヒヤリでした。力ずくで取って事なきを得たが、口の中が切れて血だらけになった。目を離したときの出来事で驚いた。
8	薬箱をいつのまにか取って、おやつと間違えて食べそうになっていた。
9	子供の肌が弱く、カサカサすると保湿剤を塗っていたが、舐めてしまうことがあったため、寝る前など、舐めない時に塗るようにした。
玩具	
1	小さい玩具を口に入れてしまう。
2	おままごとの野菜が小さめで、初めは食べるふりをしているも、誤飲の可能性があると感じた。
3	小さい笛のおもちゃを吹きながら歩き回っている時、ふとしたことで飲み込まないかヒヤヒヤした。
4	2 歳を過ぎてなんでも口に入れたりしなくなったと思い、小さなものでも目の届く範囲で好きに遊ばせていたら、ふざけてわざとビー玉や磁石を口に入れるようになった。
5	おもちゃの車のタイヤが外れるようになっていて、子どもがそのタイヤを口に入れてしまうので危ないと思った。
6	上の子がビーズで作る時にどうしても周りに何粒かは散ってしまうので、その頃 1 歳くらいだった下の子が口へいれないように注視していた。
7	兄弟がおり、上の子が使っていた小さいブロックが下に落ちていて、それを食べようとしていた。
8	おもちゃの電池蓋を止めているネジが落ちていて、子どもが手に取っていた。

9	玩具のシールを剥がして口の中に入れていた。飴のように舐めているだけで飲み込もうとはしていなかった。
10	シャボン玉は吹いたあとにストローから吸ってしまった。幸い少量で飲み込むまでしなかったが、そのあとがよかった。
11	ビー玉やビーズのような小さく丸い物体は、飴玉の類を連想させる様子で危ないと思った。
12	大人は気をつけていても、一緒に遊ぶ幼い兄弟は赤ちゃんが何でも口に入れてしまうということを意識して遊ぶことはできないので、仲良く遊んでるなど安心して目を離れた瞬間にプラスチック製の組み立てブロックを口の中に！ということがありました。
13	毛の長いぬいぐるみや服、毛糸を誤って誤飲し絡まり吐き出すのが大変だった。
洗剤	
1	誤飲はしなかったが、漂白剤を手にとっていた時はヒヤリとした。
2	今回の回答の対象でない上の子が、柔軟剤を飲んだことがある。
3	台所や洗面所の低いところに入れている洗剤や油など、気が付けば開けて触っていたことがあった。
4	哺乳瓶の消毒液の蓋を口に軽くふくもうとしていた。
5	娘がキッチン用の漂白剤などが入っている棚を開けてしまい、私たちが寝てる間に風呂場からリビングまで運んでいたのも、もしかしたら口に入れていたかと思うと恐ろしかった。
6	最近の洗剤はカラフルで子供の興味を得やすいので気をつけている。
7	開封済みの洗剤の詰め替えパックの蓋を開けて床に液体を広げていた。蓋を開けられないと思っていたので驚いた。蓋も小さく、洗剤を舐めたり蓋を口にいれなくて良かった。
8	ビーズタイプの柔軟剤が床に落ちていた時、まだはいはいをする年齢だったのでヒヤッとした。それからビーズタイプの柔軟剤は買わないようになった。
9	年末の大掃除をしていて、住宅用液体洗剤を自分のそばに置いていたら、ふと目を離れた隙に舐めそうになっていた。夫婦で掃除していて目を逸らしたので気をつけようと思った。
石鹸・化粧品	
1	小さいころ、トイレの便器の中につけている、ゼリーみたいな石鹸を手に取りそうになって焦った。
2	入浴剤（固形タイプ）がラムネみたいで、おいしそうと食べそうになったことがある。
3	液体石鹸を舐めてヒヤリとしたことがある。
4	テーブルにメイク道具を入れたポーチを置いていたところ、自分で開けて中のチークやアイシャドウの粉を舐めてしまった。少量だったので、とりあえず様子を見た。
5	化粧ポーチに入れているものに興味を持って口に入れようとしたときはヒヤッとした。
乾燥剤・殺虫剤・芳香剤	
1	子供が保冷剤を噛んでいたら、中のジェルが出てきてしまった。
2	ゴキブリ除けの駆除剤、目につきにくい場所に置いていたので気が付いてしまうと宝を見つけたように喜んで手にとってしまう。あまり触ってほしくないのだが、禁止するのは難しいと感じる。
3	ラムネに似ている防虫剤など勘違いしやすいので、開かないように工夫するか形状を変えて欲しい。
4	シリカゲルの乾燥剤をお菓子と勘違いして、包みを破ろうとしている時があった。
5	防虫剤がラムネや飴に見えるようで、ちょーだいと言ってきたことがある。
6	子ども服を購入した際、パッケージに乾燥剤か防虫剤のシートが入っていて、そのシートを手にとって口にくわえていたことがあり、その時は危険な薬剤が含まれているのではないかと思い、子どもの救急医療センターのような所に問い合わせた。結果的に、特に症状は出ませんでしたでしたが、かなりドキッとしました。

電池	
1	玩具のボタン電池に興味深々で替えているときに触りたがった。
2	小学生のお兄ちゃんに、使用済み電池を貯めている袋に新たに出たボタン電池を入れさせ、元の場所に戻すという一連の流れをさせたとき、1つ落ちてしまい、それをいつの間にか赤ちゃんが拾っていた。
3	お祭りでもらった光るおもちゃにボタン電池が入っていた。そのおもちゃが壊れて電池が出てきてしまった状態で見つけたが、もともと何個の電池を使用していたかがわからず、落ちてたボタン電池で全てなのか、誤飲してしまったのではないかと不安だった。
4	おもちゃの電池やリモコンの電池のフタが緩くなっていてパカパカ開きやすくなっていて、気がつくと電池が落ちている時があるのでテープで補強している。落ちていて万が一口に入れてしまうと大変なので。
5	リモコンを欲しがるときに電池を抜いて渡すのだが、電池を抜くことを見て覚えていたようで、テレビがついていない時に電池を抜かないでリモコンを渡したら、自分で電池を抜いて持っていた。
6	リモコンで遊ぶのが好きで、落とした際に電池入れの蓋が外れ、電池が転がり、それを拾おうとした。
7	体重計の電池を変えようと思い、複数個の乾電池をだしていた際、乾電池をベタベタ触って口の近くに持っていった時は本当にヒヤリとした。
8	小さいサイズの電池を食べようとしていたのでもなるべく子供が手の届かない場所に管理している。
9	おもちゃの変身ベルトのボタン電池交換時に、気付かない間に子供が近くに居て、ドライバーや電池に触ってしまった。
その他家庭用品	
1	絵本をかじって食べてしまう。
2	新聞や紙、ティッシュペーパーを良く食べようとしている。
3	ペットボトルの外装のビニールを遊んでいるうちに噛みちぎり、飲み込んでしまった。
4	ペットボトルの蓋を咥えていたことがあり、飲み込まなかったものの、ヒヤリとした。
5	ストローが入っているプラスチックの袋を飲み込んでしまい、のどに貼り付いた様で苦しそうになり吐いて出てきた。
6	ラップに巻いたおにぎりを渡したら、ラップも少し食べてしまっていた。
7	上の子が使う消しゴム。知らないうちに持って食べようとしていた。
8	ゴミ箱から取り出して口に入れようとするのがあったので、ゴミ箱も危険。
9	自分の着ている洋服のボタンを噛んでいるときがあり、意外と力も強いのでボタンが取れて誤飲しないかヒヤリとした。ボタン付きではない洋服を着せた方がよいと思った。
10	イヤホンのクッションの部分がなくなっているのに気付く、誤飲したのではないかとヒヤヒヤした。息子の状態は特に変わらなかったのも誤飲していないと思うが、その後イヤホンのクッションの部分は出てきていない。話し合っただけでなくイヤホンは使わないことを決めた。
11	携帯の充電コードなどコード類を見つけると、噛んでいることが多いので手に届かないようにしたり、目につきにくい位置にしている。
12	コンセントに刺さったままの充電ケーブルを舐めていた時はヒヤッとした。
13	使用済みの爪楊枝を落としていたことがあり、子供が手に触れる前に発見したので事故にはならなかった。
14	お店でもらうプラスチックのスプーンでプリンを食べさせていたら、おいしくてスプーンをガチガチ噛んでしまい、口の中で割れていて危ないと思った。
15	アルコール除菌のジェルをなめていた。
16	手が届かないところに置いておいた植木にいつのまにか手が届く様になり、木製チップを口に入れていた。

食品	
1	飴を大きいまま飲み込んでしまいヒヤリとした。
2	食べられるだろうと思い、スティック状のパンをそのまま持たせ1人で食べさせたが、どんどん口の中に詰め込み飲み込めなくなってヒヤリとした。
3	冷凍したゼリーを喉に詰まらせ、背中を叩いて吐き出させた。
4	床に落ちているものを何でも口に入れてしまう時期があり、カピカピになったご飯粒を口に入れてしまった。すぐに吐き出させましたがヒヤリとした。
5	年齢的にも心配することはほとんどないが、口に入れる量が多いので、お餅をあげる時は目を離さない様にしている。
6	普段は食べられているいちごを、一気に口に詰め込みすぎて、指を突っ込んでかき出した。
7	2〜3才の頃だったと思うが、ラムネを食べさせていたら、喉につまりかけたことがある。すぐに吐き出すことができたが、ヒヤリとした。
8	コップに入っていた氷が喉に詰まって呼吸ができなくなっていた。背中を叩いて出したが、少し溶けた氷でもこうなるのだとヒヤリとした。
9	離乳食を進める上で食材のサイズを徐々に大きくしていく。この時によく言われる注意食材(ミニトマト、ナッツ、餅など)は注意するが、常食しているカボチャは噛めるだろうと思って与えたところ、思いがけず喉に詰めたことがあり、それ以降サイズは小さめで与えている。
10	牛丼の筋が喉に引っ掛かり、苦しそうにしていた。それから、牛丼は細かく切るようにしている。
11	口の中に沢山食べ物を入れて、一気に飲み込もうとしていた時。
12	魚の骨は気をつけていたが、見つけられずに飲み込んでしまったので、かなり慌てた。その時は自然にとれたので大事に至らなかったが、病院に行くことも考えた。
13	6歳の時にタピオカドリンクを飲んでいて、ストローで飲ませていたら、勢いよく吸って喉に詰まりそうになった。それからは、コップに出してスプーンで飲ませている。
14	グミを飲み込んでしまった時はしばらく苦しそうにしていた、かなり焦った。
15	子どもがお腹がすいて急いで食べようとして小さな海苔巻も喉に詰まらせかけた。しっかり握ってあるおにぎりや海苔が巻いているものは注意しようと思った。
その他の食品	
1	お酒の缶や瓶がジュースみたいにかわいいので興味を持ってしまう。
2	お酒を飲みかけで置いて、お茶割りだったのでお茶と勘違いした子供が口をつけてしまった。すぐグラスを取ったので飲んでないが、苦しそうな顔をしたのでちょっと付いたみたいだった。
3	醤油差しを机の上に置いたままお皿を流しに持っていくため、子供から目を離したところ、子供が醤油差しに口をつけ飲もうとしていた。目を離した時間は20秒程度。
4	サプリメントのビタミン剤をお菓子と勘違いして食べていた。メーカーに問い合わせ、大事にはいたらなかったが、もし薬品だったらと思うと怖かった。
5	塩を棚から持ってきて、水で薄めて飲んでた。今回は塩で良かったが、他のものなら考えると怖い。

その他	
1	ペットのうさぎの水や餌を口に入れてしまうことがある。
2	猫のトイレにある猫砂を食べそうになっていた。トイレ自体は立ち入れない区画にあるものの、猫にくっついてきた猫砂が落ちていた。
3	上の息子がまだ2歳の時に実家にいる愛犬に菓をあげるため、テーブルの上にティッシュを置いて菓を2粒置いていた。何故か私の両親も私も何かに気を取られてしまい、愛犬に菓を飲ます際に見当たらず、ラムネだと思って誤飲。病院へ行き様子をみることになり、結果問題はなかったが眠れないほど心配した。
4	お風呂で浴槽の湯を飲みそうになったことがある。
5	ほこりのかたまりを部屋の端から見つけて口に含み、気づいた時には飲み込んでしまった。
6	歯ブラシくわえながら歩きまわるのが怖くてしょうがない。
7	子どもが同い年くらいの子供と遊んでいた際、殺虫剤をお友達に噴射していて、トラブルになった。
その他：外出時に落ちているもの	
1	公園に落ちている吸殻を拾って口に入れそうになったことがある。
2	公園で小石や砂を飲み込みそうになってヒヤリとした。
3	タバコを家族で吸う者はいないが、公園に落ちている吸殻を拾い上げて口に入れそうになったことがある。
4	公園や道に落ちてるゴミ。自分の家と違って掃除をしたりして防ぎようがないのと、子供にとってはゴミですら新鮮なようで興味関心が止められなくて困る。
5	公園でBB弾が落ちていて、口に入れそうになった。
6	公園に行ったとき、少し目を離したすきに、どんぐりを口の中に入れていた。飲み込んでいたらと思うと恐怖が止まらない。
7	散歩中、公園で上の子の面倒を見ている間に、下の子が生えていたキノコを持って眺めていた。何でも口に入れる時期だったので、すぐに捨てさせて手を洗わせた。
8	植え込みの葉や花に興味をもち、食べようとしていたときは慌てて止めた。
その他：鼻や耳へ	
1	鼻の穴に豆をつめた時はなかなか取れなくて焦った。
2	誤飲ではないが、子供が小指の先くらいの大きさのプラスチックビーズを鼻に詰めてしまい、奥に入って取れなくなったことがある。予想もしなかったことにかなり慌てた。幸い病院ですぐ取り出してもらえ、事なきを得た。
3	私がジェルネイルをしていたときに、取れてしまったチップを鼻に突っ込んでしまい大騒ぎになった。連休の深夜であったため、救急に駆け込んだ。もう二度とジェルネイルをしないと決めました。
4	誤飲ではないが、小さいラムネを鼻の穴に入れてしまったことがあった。ピンセットで取ることができたが、ヒヤリとした経験だった。
5	口の中ではないが、鼻の穴やに水でくっつくビーズを入れてしまった。鼻の中の水分にくっついてしまって取れなくなり耳鼻科で取ってもらった。
6	誤飲ではなく、鼻の穴にビーズやラムネを入れてしまい、耳鼻科で取ってもらった。
7	ボタンを鼻の中に入れて出てこなくなったときに焦った。
8	長細いものとかを耳に入れようとしていたことがあり、危険と感じた

Ⅲ. まとめ

東京都では、平成 21 年度から乳幼児やシニア世代を中心としたヒヤリ・ハット調査を行い、事故防止ガイド等を通じて消費者への注意喚起を行っている。

今回は、乳幼児（生後 6 か月以上から小学校入学前の 6 歳児）を対象に、身の回りの製品や食品での誤飲等及びヒヤリ・ハット経験等の事例収集を主な目的としたアンケート調査を実施した。

子供の行動は予想外のこともあり、また、子供が成長していく過程で危害やヒヤリ・ハット経験が発生しないことは現実的には考えにくいことから、危害を最小限に食い止めるために、子供がいる環境においては、今回の調査結果と同様の事例が自分の周りでも起こり得るということ意識して、住宅や施設内で危険を回避するための注意・工夫が必要である。

また、製品を提供する事業者等は、誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の事例や保護者等の要望を収集し、乳幼児の安全及び事故防止に十分留意した上で製品開発を行う必要がある。家庭内の製品における利便性、デザイン性が高まった現在、安全性の確保は製品開発の基本であるとともに、製品の高付加価値に繋がるという意識を持って製品開発を行う必要がある。

【今後の取組】

- （１）誤飲等及びヒヤリ・ハット経験の事例及び事故防止のポイントをまとめた事故防止ガイド（ヒヤリ・ハットレポート）を作成し、ホームページ（東京くらし WEB）へ掲載するとともに、保育所や幼稚園等への配布やイベントでの配布等を通じて、消費者への注意喚起に使用する。
- （２）国及び関係事業者団体等へ調査結果を情報提供する。
- （３）収集した誤飲等及びヒヤリ・ハット経験等を事故の未然・拡大防止のための調査の基礎データとする。

IV. アンケート調査内容

Q1		100%
あなたのお住いの都道府県を教えてください。		
☐ 単一回答 ☒ 必須回答		
①	東京都	
②	神奈川県	
③	千葉県	
④	埼玉県	
⑤	その他	

Q2		
あなたと同居しているお子さんの人数を教えてください。		
※同居しているお子さんが、あなたの弟・妹の関係にあたる場合は、そのお子さんを除いた人数をご回答ください。		
☐ 単一回答 ☒ 必須回答		↓ とじる
①	子供はいない/同居している子供はいない	
【同居している子供がいる】		
②	1人	
③	2人	
④	3人	
⑤	4人以上	

Q3

あなたと同居しているお子さんの性別・年齢を教えてください。（いくつでも）
※同居しているお子さんが、あなたの弟・妹の関係にあたる場合は、そのお子さんを
除いてご回答ください。

✓ 複数回答 ★ 必須回答

▲ とじる

1 男児6ヶ月未満

2 男児6ヶ月以上1歳未満

3 男児1歳

4 男児2歳

5 男児3歳

6 男児4歳

7 男児5歳

8 男児小学校入学前で6歳

9 男児小学生以上

10 女児6ヶ月未満

11 女児6ヶ月以上1歳未満

12 女児1歳

13 女児2歳

14 女児3歳

15 女児4歳

16 女児5歳

17 女児小学校入学前で6歳

18 女児小学生以上

ここからは、「誤飲」に関する危害及びヒヤリ・ハット経験を伺います。

Q1

この中で、ご家庭にある製品を教えてください。

また、その製品をお子さんが誤飲したことや、誤飲しそうになってヒヤリとした経験はありますか。

ご自身と同居している【【AC1の選択内容】】のお子さんのことについてお答えください。

※同居しているお子さんが、あなたの弟・妹の関係にあたる場合は、そのお子さんを除いてご回答ください。（以降も同様）

◎ 単一回答

★ 必須回答

▲ とじる

0/10

1 たばこ

（たばこ、電子たばこ、加熱式たばこ、使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル）、たばこの浸出液、その他）



<イメージ> 電子たばこを詰め替えようとして、カプセルを机の上に置いたところ丁度電話が鳴り、そのまま放置しておいたところ、子供が口にくわえていた。口の中には入れてなかったが、ヒヤリとした。

2 医薬品

（風邪薬、胃腸薬、外皮用薬、眼科用剤、耳鼻科用剤、その他）



<イメージ> 甘い味のするシロップ状の風邪薬を飲ませたところ、目を離した隙に残りの風邪薬を飲んでしまった。ただ、飲んだ量は少なかったため病院へ行かず家で様子を見た。

3 玩具

（ビー玉、ビーズ、スーパーボール、ブロック・積み木、ミニカー、食べ物の形をした玩具（ままごと玩具）、シール、玩具の弾丸、シャボン玉液、ケミカルライト、磁石を使った玩具、その他の小型玩具）



<イメージ> 上の子がノートにシールを沢山貼って遊んでいたところ、いくつか机の下に落ちたシールを下の子が食べてしまい、苦しそうに咳き込んでいた。驚いて背中をたたいて吐かせた。

4 洗剤

（食器洗い用洗剤、衣料用洗剤、トイレ用洗剤、風呂用洗剤、漂白剤（食器用）、漂白剤（衣類用）、カビ取り剤、その他）



＜イメージ＞詰め替え用の残りをペットボトルに入れて台所においたところ、子供が飲み物と勘違いし、飲んでしまった。病院に行き、検査後、胃洗浄をもらった。

5 石鹸・化粧品等

（化粧品、マニキュア・マニキュア除去液、固形石鹸、ボディシャンプー、歯磨き粉、シャンプー・リンス・コンディショナー、入浴剤、その他）



＜イメージ＞洗面所に置いておいた固形石鹸を子供がお菓子だと思って食べてしまった。気づくのが遅れたが、子供は特に変わった様子もなく、病院に行くと医者から様子を見ましようとのことで、そのまま帰宅した。

6 乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等

（乾燥剤・脱酸素剤（食品用）、消臭剤・脱臭剤、衣類用防虫剤、殺虫剤、保冷剤、その他）



＜イメージ＞おやつを与えたが、袋の中に乾燥剤の外袋だけあって、中身が入ってなかった。子供に聞いたところ、中身を食べてしまったと話したので、急いで病院へ行き、処置をもらった。

7 電池



＜イメージ＞おもちゃの電池カバーが外れてしまい、飛び出していたボタン電池を口に入れていたので、慌てて吐き出させた。

8

その他家庭用品

(硬貨、磁気治療器、磁石、紙、ペットボトルの蓋、アクセサリ、ケーキの飾り、ビニール袋、水を含むと膨らむ製品、その他)



<イメージ> クリスマスケーキに砂糖でできたサンタの人形とローソクを飾り付けたが、子供はどちらも食べられると思い、目を離した隙に食べてしまっていた。自分ですぐ気が付いて吐いていたが、そのまま飲み込んでいたと思うとヒヤッとした。

9

食品

(飴、パン、ベビー用のせんべい・ビスケット、ゼリー(こんにやく入りゼリー以外)、こんにやく入りゼリー、ご飯(米)、餅、果物、豆類、その他)



<イメージ> 飴を口に入れた状態でつまずき、その拍子に飲み込んでしまった。とても苦しそうにしていたため、急いで背中をたたき、口から出てきたがとても驚いた。

10

その他

(酒類、しょうゆ、アルコールを含む食品、健康食品・健康補助食品、その他)

- ① 製品を所有しており、誤飲したことや、誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある
- ② 製品を所有しているが、誤飲したことも誤飲しそうになってヒヤリとしたこともない
- ③ 製品を所有していない・購入していない

Q2

Q1で「製品を所有しており、誤飲したことや、誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」と答えた方に質問です。

お子さんが以下の製品を誤飲をしたり、誤飲しそうになってヒヤリとした経験はありますか。

複数経験がある方は、最も危害の程度が大きかったときのことを回答してください。

【その他以外必須】

◎ 単一回答

▲ とじる

0/71

1.たばこ	
1 未使用のたばこ	▼
2 未使用の電子たばこ	▼
3 未使用の加熱式たばこ	▼
4 使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル）	▼
5 たばこの浸出液 ※吸殻が溶けた灰皿の水等	▼
6 その他のたばこ→（具体的に ） ※状態が不明な場合等	▼
2.医薬品	
7 風邪薬 ※解熱鎮痛剤、呼吸器官用薬等	▼
8 胃腸薬	▼
9 外皮用薬 ※かぶれ用薬、消毒液等	▼
10 眼科用剤・耳鼻科用剤 ※点眼薬、点鼻薬等	▼
11 その他の医薬品→（具体的に ） ※アレルギー薬等	▼
3.玩具	
12 ビーズ	▼
13 ビーズ	▼
14 スーパーボール	▼
15 ブロック・積み木	▼
16 ミニカー ※ミニカーのタイヤ等部品も含む	▼
17 食べ物の形をした玩具（ままごと玩具）	▼
18 シール	▼
19 玩具の弾丸（球状の小さな弾丸（BB弾等）、ソフト弾丸等）	▼
20 シャボン玉液	▼
21 ケミカルライト ※発光するペンライト、プレスレット等	▼
22 磁石を使った玩具 ※パズル、組立おもちゃ、釣りのおもちゃ等	▼
23 その他の小型玩具→（具体的に ） ※オセロ、人形、粘土、カードゲーム、こま、ジグソーパズル等	▼

4.洗浄剤		
²⁴	食器洗い用洗剤	▼
²⁵	衣料用洗剤	▼
²⁶	トイレ用洗剤	▼
²⁷	風呂用洗剤	▼
²⁸	漂白剤（食器用）	▼
²⁹	漂白剤（衣類用）	▼
³⁰	カビ取り剤	▼
³¹	その他の洗剤→（具体的に ） ※排水口用洗剤等	▼
5.石鹸・化粧品等		
³²	化粧品 ※クリーム・化粧水・乳液・口紅等	▼
³³	マニキュア・マニキュア除去液	▼
³⁴	固形石鹸	▼
³⁵	ボディーシャンプー	▼
³⁶	歯磨き粉	▼
³⁷	シャンプー・リンス・コンディショナー	▼
³⁸	入浴剤	▼
³⁹	その他の石鹸・化粧品等→（具体的に ） ※洗口剤、脱毛剤、脱色剤、香水、ヘアスプレー、コンタクトレンズ洗浄液等	▼
6.乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等		
⁴⁰	乾燥剤・脱酸素剤（食品用）	▼
⁴¹	消臭剤・脱臭剤	▼
⁴²	衣類用防虫剤	▼
⁴³	殺虫剤 ※ホウ酸ダンゴ、蚊取りマット等、虫よけ剤も含む	▼
⁴⁴	保冷剤	▼
⁴⁵	その他の乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等→（具体的に ） ※殺鼠剤、除草剤等	▼

7.電池	
⁴⁶ 電池	▼
8.その他家庭用品	
⁴⁷ 硬貨	▼
⁴⁸ 磁気治療器 ※磁気パッチ等、体に貼り付ける小型のもの	▼
⁴⁹ 磁石 ※棒磁石、冷蔵庫にくっつけるもの等	▼
⁵⁰ 紙 ※新聞・雑誌・ティッシュペーパー・紙おむつ等	▼
⁵¹ ペットボトルの蓋	▼
⁵² アクセサリー ※指輪、ヘアピン、イヤリング等	▼
⁵³ ケーキの飾り ※クリスマスケーキの上のツリーやサンタの人形等	▼
⁵⁴ ビニール袋 ※菓子の袋、スーパーの袋等	▼
⁵⁵ 水を含むと膨らむ製品 ※ジェリーボール、膨らむタオル・スポンジ・パフ、高吸水性樹脂等	▼
⁵⁶ その他の家庭用品→（具体的に ） ※体温計、携帯ストラップ、キーホルダー、スプーン、ひも、クリップ、画紙、ペット用品、ペン、消しゴム、肥料、マッチ、塗料等	▼
9.食品	
⁵⁷ 飴	▼
⁵⁸ パン	▼
⁵⁹ ベビー用のせんべい・ビスケット	▼
⁶⁰ ゼリー（こんにやく入りゼリー以外）	▼
⁶¹ こんにやく入りゼリー	▼
⁶² ご飯（米）	▼
⁶³ 餅	▼
⁶⁴ 果物	▼
⁶⁵ 豆類	▼
⁶⁶ その他の食品→（具体的に ） ※海苔、氷、糸こんにやく、麺類、団子等	▼

10.その他	
67	酒類 ※ビール等 ▼
68	しょうゆ ▼
69	アルコールを含む食品 ※ケーキ、ゼリー、チョコレート、ジャム、もずく等 ▼
70	健康食品・健康補助食品 ※サプリメント等 ▼
71	その他→（具体的に ） ▲
① 誤飲したことがある	
② 誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある	
③ 誤飲したりヒヤリとした経験はない	
④ この製品は所有していない・購入していない	

Q3

Q2で「誤飲したことがある」／「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」と答えた方に質問です。

その経験でのお子さんの誤飲の程度はどのようなものでしたか。

最もあてはまるものをお選びください。

複数経験がある方は、最も危害の程度が大きかったときのことを回答してください。

◎ 単一回答 ★ 必須回答

▲ とじる

0/71

1.たばこ	
1	未使用のたばこ ▼
2	未使用の電子たばこ ▼
3	未使用の加熱式たばこ ▼
4	使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル） ▼
5	たばこの浸出液 ※吸殻が溶けた灰皿の水等 ▼
6	その他のたばこ 【Q2S6FAの選択内容】 ▼

2.医薬品	
7	風邪薬 ※解熱鎮痛剤、呼吸器官用薬等 ▼
8	胃腸薬 ▼
9	外皮用薬 ※かぶれ用薬、消毒液等 ▼
10	眼科用剤・耳鼻科用剤 ※点眼薬、点鼻薬等 ▼
11	その他の医薬品 【Q2S11FAの選択内容】 ▼

3.玩具		
¹²	ビー玉	▼
¹³	ビーズ	▼
¹⁴	スーパーボール	▼
¹⁵	ブロック・積み木	▼
¹⁶	ミニカー ※ミニカーのタイヤ等部品も含む	▼
¹⁷	食べ物の形をした玩具（ままごと玩具）	▼
¹⁸	シール	▼
¹⁹	玩具の弾丸（球状の小さな弾丸（BB弾等）、ソフト弾丸等）	▼
²⁰	シャボン玉液	▼
²¹	ケミカルライト ※発光するペンライト、ブレスレット等	▼
²²	磁石を使った玩具 ※パズル、組立おもちゃ、釣りのおもちゃ等	▼
²³	その他の小型玩具 【Q2S23FAの選択内容】	▼
4.洗剤		
²⁴	食器洗い用洗剤	▼
²⁵	衣料用洗剤	▼
²⁶	トイレ用洗剤	▼
²⁷	風呂用洗剤	▼
²⁸	漂白剤（食器用）	▼
²⁹	漂白剤（衣類用）	▼
³⁰	カビ取り剤	▼
³¹	その他の洗剤 【Q2S31FAの選択内容】	▼
5.石鹸・化粧品等		
³²	化粧品 ※クリーム・化粧水・乳液・口紅等	▼
³³	マニキュア・マニキュア除去液	▼
³⁴	固形石鹸	▼
³⁵	ボディーシャンプー	▼
³⁶	歯磨き粉	▼

³⁷ シャンプー・リンス・コンディショナー	▼
³⁸ 入浴剤	▼
³⁹ その他の石鹸・化粧品等 【Q2S39FAの選択内容】	▼
6.乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等	
⁴⁰ 乾燥剤・脱酸素剤（食品用）	▼
⁴¹ 消臭剤・脱臭剤	▼
⁴² 衣類用防虫剤	▼
⁴³ 殺虫剤 ※ホウ酸ダンゴ、蚊取りマット等、虫よけ剤も含む	▼
⁴⁴ 保冷剤	▼
⁴⁵ その他の乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等 【Q2S45FAの選択内容】	▼
7.電池	
⁴⁶ 電池	▼
8.その他家庭用品	
⁴⁷ 硬貨	▼
⁴⁸ 磁気治療器 ※磁気パッチ等、体に貼り付ける小型のもの	▼
⁴⁹ 磁石 ※棒磁石、冷蔵庫にくっつけるもの等	▼
⁵⁰ 紙 ※新聞・雑誌・ティッシュペーパー・紙おむつ等	▼
⁵¹ ペットボトルの蓋	▼
⁵² アクセサリー ※指輪、ヘアピン、イヤリング等	▼
⁵³ ケーキの飾り ※クリスマスケーキの上のツリーやサンタの人形等	▼
⁵⁴ ビニール袋 ※菓子の袋、スーパーの袋等	▼
⁵⁵ 水を含むと膨らむ製品 ※ジェリーボール、膨らむタオル・スポンジ・パフ、高吸水性樹脂等	▼
⁵⁶ その他の家庭用品 【Q2S56FAの選択内容】	▼

9.食品	
57	飴 ▼
58	パン ▼
59	ベビー用のせんべい・ビスケット ▼
60	ゼリー（こんにゃく入りゼリー以外） ▼
61	こんにゃく入りゼリー ▼
62	ご飯（米） ▼
63	餅 ▼
64	果物 ▼
65	豆類 ▼
66	その他の食品 【Q2S66FAの選択内容】 ▼

10.その他	
67	酒類 ※ビール等 ▼
68	しょうゆ ▼
69	アルコールを含む食品 ※ケーキ、ゼリー、チョコレート、ジャム、もずく等 ▼
70	健康食品・健康補助食品 ※サプリメント等 ▼
71	その他 【Q2S71FAの選択内容】 ▲

①	飲み込んで医療機関に入院した
②	飲み込んで医療機関を受診した
③	飲み込んだが医療機関は受診しなかった
④	口にいったが飲み込まなかった
⑤	口に入れそうになった

Q4

Q3で2.医薬品、4.洗浄剤、5.石鹼・化粧品等、6.乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等、のいずれかで「飲み込んで医療機関に入院した」、「飲み込んで医療機関を受診した」と答えた方に質問です。

医療機関で受けた措置についてあてはまるものをお選びください。

複数経験がある方は、最も危害の程度が大きかったときのことを回答してください。

※表示された項目についてお答えください。

◎ 単一回答 ★ 必須回答

▲ とじる

0/27

2.医薬品

1	風邪薬 ※解熱鎮痛剤、呼吸器官用薬等	▼
2	胃腸薬	▼
3	外皮用薬 ※かぶれ用薬、消毒液等	▼
4	眼科用剤・耳鼻科用剤 ※点眼薬、点鼻薬等	▼
5	その他の医薬品 【Q2S11FAの選択内容】	▼

4.洗浄剤

6	食器洗い用洗剤	▼
7	衣料用洗剤	▼
8	トイレ用洗剤	▼
9	風呂用洗剤	▼
10	漂白剤（食器用）	▼
11	漂白剤（衣類用）	▼
12	カビ取り剤	▼
13	その他の洗剤 【Q2S31FAの選択内容】	▼

5.石鹸・化粧品等	
¹⁴ 化粧品 ※クリーム・化粧水・乳液・口紅等	▼
¹⁵ マニキュア・マニキュア除去液	▼
¹⁶ 固形石鹸	▼
¹⁷ ボディーシャンプー	▼
¹⁸ 歯磨き粉	▼
¹⁹ シャンプー・リンス・コンディショナー	▼
²⁰ 入浴剤	▼
²¹ その他の石鹸・化粧品等 【Q2S39FAの選択内容】	▼

6.乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等	
²² 乾燥剤・脱酸素剤（食品用）	▼
²³ 消臭剤・脱臭剤	▼
²⁴ 衣類用防虫剤	▼
²⁵ 殺虫剤 ※ホウ酸ダンゴ、蚊取りマット等、虫よけ剤も含む	▼
²⁶ 保冷剤	▼
²⁷ その他の乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等 【Q2S45FAの選択内容】	▲

① 経過観察
② 胃洗浄
③ 点滴・投薬
④ 血液検査
⑤ その他 (具体的に (必須入力))

Q5

Q2で「誤飲したことがある」／「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」と答えた方に質問です。

その当時のお子さんの性別・年齢を教えてください。

複数経験がある方は、最も危害の程度が大きかったときのことを回答してください。

※現在の年齢ではなく、誤飲をしたり、誤飲しそうになった当時の年齢をお答えください。

◎ 単一回答

★ 必須回答

▲ とじる

0/71

1. たばこ

- ¹ 未使用のたばこ ▼
- ² 未使用の電子たばこ ▼
- ³ 未使用の加熱式たばこ ▼
- ⁴ 使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル） ▼
- ⁵ たばこの浸出液 ※吸殻が溶けた灰皿の水等 ▼
- ⁶ その他のたばこ 【Q2S6FAの選択内容】 ▼

2. 医薬品

- ⁷ 風邪薬 ※解熱鎮痛剤、呼吸器官用薬等 ▼
- ⁸ 胃腸薬 ▼
- ⁹ 外皮用薬 ※かぶれ用薬、消毒液等 ▼
- ¹⁰ 眼科用剤・耳鼻科用剤 ※点眼薬、点鼻薬等 ▼
- ¹¹ その他の医薬品 【Q2S11FAの選択内容】 ▼

3. 玩具

- ¹² ビー玉 ▼
- ¹³ ビーズ ▼
- ¹⁴ スーパーボール ▼
- ¹⁵ ブロック・積み木 ▼
- ¹⁶ ミニカー ※ミニカーのタイヤ等部品も含む ▼
- ¹⁷ 食べ物の形をした玩具（ままごと玩具） ▼

Q5

Q2で「誤飲したことがある」／「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」と答えた方に質問です。

その当時のお子さんの性別・年齢を教えてください。

複数経験がある方は、最も危害の程度が大きかったときのことを回答してください。

※現在の年齢ではなく、誤飲をしたり、誤飲しそうになった当時の年齢をお答えください。

◎ 単一回答

★ 必須回答

▲ とじる

0/71

1. たばこ

- ¹ 未使用のたばこ ▼
- ² 未使用の電子たばこ ▼
- ³ 未使用の加熱式たばこ ▼
- ⁴ 使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル） ▼
- ⁵ たばこの浸出液 ※吸殻が溶けた灰皿の水等 ▼
- ⁶ その他のたばこ 【Q2S6FAの選択内容】 ▼

2. 医薬品

- ⁷ 風邪薬 ※解熱鎮痛剤、呼吸器官用薬等 ▼
- ⁸ 胃腸薬 ▼
- ⁹ 外用薬 ※かぶれ用薬、消毒液等 ▼
- ¹⁰ 眼科用剤・耳鼻科用剤 ※点眼薬、点鼻薬等 ▼
- ¹¹ その他の医薬品 【Q2S11FAの選択内容】 ▼

3. 玩具

- ¹² ビー玉 ▼
- ¹³ ビーズ ▼
- ¹⁴ スーパーボール ▼
- ¹⁵ ブロック・積み木 ▼
- ¹⁶ ミニカー ※ミニカーのタイヤ等部品も含む ▼
- ¹⁷ 食べ物の形をした玩具（ままごと玩具） ▼
- ¹⁸ シール ▼
- ¹⁹ 玩具の弾丸（球状の小さな弾丸（BB弾等）、ソフト弾丸等） ▼

²⁰ シャボン玉液	▼
²¹ ケミカルライト ※発光するペンライト、プレスレット等	▼
²² 磁石を使った玩具 ※パズル、組立おもちゃ、釣りのおもちゃ等	▼
²³ その他の小型玩具 【Q2S23FAの選択内容】	▼

4.洗浄剤

²⁴ 食器洗い用洗剤	▼
²⁵ 衣料用洗剤	▼
²⁶ トイレ用洗剤	▼
²⁷ 風呂用洗剤	▼
²⁸ 漂白剤（食器用）	▼
²⁹ 漂白剤（衣類用）	▼
³⁰ カビ取り剤	▼
³¹ その他の洗剤 【Q2S31FAの選択内容】	▼

5.石鹸・化粧品等

³² 化粧品 ※クリーム・化粧水・乳液・口紅等	▼
³³ マニキュア・マニキュア除去液	▼
³⁴ 固形石鹸	▼
³⁵ ボディーシャンプー	▼
³⁶ 歯磨き粉	▼
³⁷ シャンプー・リンス・コンディショナー	▼
³⁸ 入浴剤	▼
³⁹ その他の石鹸・化粧品等 【Q2S39FAの選択内容】	▼

6.乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等

⁴⁰ 乾燥剤・脱酸素剤（食品用）	▼
⁴¹ 消臭剤・脱臭剤	▼
⁴² 衣類用防虫剤	▼
⁴³ 殺虫剤 ※ホウ酸ダンゴ、蚊取りマット等、虫よけ剤も含む	▼
⁴⁴ 保冷剤	▼
⁴⁵ その他の乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等 【Q2S45FAの選択内容】	▼

7.電池	
⁴⁶ 電池	▼
8.その他家庭用品	
⁴⁷ 硬貨	▼
⁴⁸ 磁気治療器 ※磁気パッチ等、体に貼り付ける小型のもの	▼
⁴⁹ 磁石 ※棒磁石、冷蔵庫にくっつけるもの等	▼
⁵⁰ 紙 ※新聞・雑誌・ティッシュペーパー・紙おむつ等	▼
⁵¹ ペットボトルの蓋	▼
⁵² アクセサリー ※指輪、ヘアピン、イヤリング等	▼
⁵³ ケーキの飾り ※クリスマスケーキの上のツリーやサンタの人形等	▼
⁵⁴ ビニール袋 ※菓子の袋、スーパーの袋等	▼
⁵⁵ 水を含むと膨らむ製品 ※ジェリーボール、膨らむタオル・スポンジ・パフ、高吸水性樹脂等	▼
⁵⁶ その他の家庭用品 【Q2S56FAの選択内容】	▼
9.食品	
⁵⁷ 飴	▼
⁵⁸ パン	▼
⁵⁹ ベビー用のせんべい・ビスケット	▼
⁶⁰ ゼリー（こんにゃく入りゼリー以外）	▼
⁶¹ こんにゃく入りゼリー	▼
⁶² ご飯（米）	▼
⁶³ 餅	▼
⁶⁴ 果物	▼
⁶⁵ 豆類	▼
⁶⁶ その他の食品 【Q2S66FAの選択内容】	▼

10.その他	
⁶⁷ 酒類 ※ビール等	▼
⁶⁸ しょうゆ	▼
⁶⁹ アルコールを含む食品 ※ケーキ、ゼリー、チョコレート、ジャム、もずく等	▼
⁷⁰ 健康食品・健康補助食品 ※サプリメント等	▼
⁷¹ その他 【Q2S71FAの選択内容】	▲
① 男児0歳	
② 男児1歳	
③ 男児2歳	
④ 男児3歳	
⑤ 男児4歳	
⑥ 男児5歳	
⑦ 男児6歳	
⑧ 女児0歳	
⑨ 女児1歳	
⑩ 女児2歳	
⑪ 女児3歳	
⑫ 女児4歳	
⑬ 女児5歳	
⑭ 女児6歳	

Q6

Q2で、1.たばこを「誤飲したことがある」／「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」と答えた方に質問です。

誤飲したたばこをお子さんが見つけた場所について、以下の中から選んでください。複数経験がある方は、最も危害の程度が大きかったときのことを回答してください。

◎ 単一回答

★ 必須回答

▲ とじる

0/6

1.たばこ

¹ 未使用のたばこ	▼
² 未使用の電子たばこ	▼
³ 未使用の加熱式たばこ	▼
⁴ 使用済みのたばこ（吸殻・使用済みカプセル）	▼
⁵ たばこの浸出液 ※吸殻が溶けた灰皿の水等	▼
⁶ その他のたばこ 【Q2S6FAの選択内容】	▲

- ① たばこの箱の中
- ② 灰皿の上
- ③ 空缶・ペットボトルの中
- ④ 家の中の床に落ちていた
- ⑤ 机の上
- ⑥ ゴミ箱の中
- ⑦ 公園・道路等に落ちていた
- ⑧ その他
→（具体的に ）
- ⑨ わからない

Q7

Q2で2.医薬品、4.洗浄剤、5.石鹼・化粧品等、6.乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等のいずれかを「誤飲したことがある」／「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」と答えた方に質問です。

その製品はどのような形状・種類のものでしたか。

最もあてはまるものを選んでください。

複数経験がある方は、最も危害の程度が大きかったときのことを回答してください。

※表示された項目についてお答えください。

◎ 単一回答

★ 必須回答

▲ とじる

0/27

2.医薬品

- 1 風邪薬 ※解熱鎮痛剤、呼吸器官用薬等 ▼
- 2 胃腸薬 ▼
- 3 外皮用薬 ※かぶれ用薬、消毒液等 ▼
- 4 眼科用剤・耳鼻科用剤 ※点眼薬、点鼻薬等 ▼
- 5 その他の医薬品 【Q2S11FAの選択内容】 ▼

- ① 固形・錠剤・カプセルタイプ
- ② 粉末・顆粒タイプ
- ③ 液体・ジェル・シロップタイプ
- ④ 軟膏・クリームタイプ
- ⑤ その他
→（具体的に ）
- ⑥ わからない

4.洗浄剤

- 6 食器洗い用洗剤 ▼
- 7 衣料用洗剤 ▼
- 8 トイレ用洗剤 ▼
- 9 風呂用洗剤 ▼
- 10 漂白剤（食器用） ▼
- 11 漂白剤（衣類用） ▼
- 12 カビ取り剤 ▼
- 13 その他の洗剤 【Q2S31FAの選択内容】 ▼

5.石鹸・化粧品等	
14	化粧品 ※クリーム・化粧水・乳液・口紅等 ▼
15	マニキュア・マニキュア除去液 ▼
16	固形石鹸 ▼
17	ボディーシャンプー ▼
18	歯磨き粉 ▼
19	シャンプー・リンス・コンディショナー ▼
20	入浴剤 ▼
21	その他の石鹸・化粧品等 【Q2S39FAの選択内容】 ▼

6.乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等	
22	乾燥剤・脱酸素剤（食品用） ▼
23	消臭剤・脱臭剤 ▼
24	衣類用防虫剤 ▼
25	殺虫剤 ※ホウ酸ダンゴ、蚊取りマット等、虫よけ剤も含む ▼
26	保冷剤 ▼
27	その他の乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等 【Q2S45FAの選択内容】 ▲

①	固形・錠剤タイプ
②	粉末・顆粒タイプ
③	液体タイプ
④	クリーム・ジェル・ゲルタイプ
⑤	その他 →（具体的に (必須入力) ）
⑥	わからない

Q8

Q2で7.電池を「誤飲したことがある」／「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」と答えた方に質問です。

その製品はどのような形状・種類のものでしたか。

最もあてはまるものを選んでください。

複数経験がある方は、最も危害の程度が大きかったときのことを回答してください。

⓪ 単一回答

★ 必須回答

▲ とじる

0/1

7.電池

¹ 電池

① 筒形



② ボタン型・コイン型



③ 角型・平型



④ その他

→ (具体的に)

⑤ わからない

Q9

Q2で2.医薬品を「誤飲したことがある」／「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」と答えた方に質問です。

その製品はどのような容器に入っていましたか。

最もあてはまるものを選んでください。

複数経験がある方は、最も危害の程度が大きかったときのことを回答してください。

◎ 単一回答

★ 必須回答

▲ とじる

0/5

2. 医薬品

- 1 風邪薬 ※解熱鎮痛剤、呼吸器官用薬等 ▼
- 2 胃腸薬 ▼
- 3 外皮用薬 ※かぶれ用薬、消毒液等 ▼
- 4 眼科用剤・耳鼻科用剤 ※点眼薬、点鼻薬等 ▼
- 5 その他の医薬品 【Q2S11FAの選択内容】 ▲

① ふた付き容器



② PTP包装

※薬の形に凹んだプラスチックなどに一錠ずつ分けてアルミフィルムなどで包装したもの。



③ SP包装



※薬をアルミやプラスチックのフィルムに1錠や1回分ずつ包装したもの。包装をやぶって薬を取り出す。



④ チューブ



⑤ その他容器

→ (具体的に)

⑥ 容器には入っていなかった

⑦ わからない

Q10

Q2で7.電池を「誤飲したことがある」／「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」と答えた方に質問です。

誤飲したり、誤飲しそうになった電池はどのようなものに使われてますか。

以下の中から選んでください。

複数経験がある方は、最も危害の程度が大きかったときのことを回答してください。

◎ 単一回答

★ 必須回答

▲ とじる

① リモコン

② 玩具 → (具体的に (必須入力))

③ 時計

④ 携帯電話

⑤ ビデオカメラ・デジタルカメラ

⑥ 体温計

⑦ 交換用に保管していた電池 (使用前の電池)

⑧ 使い終わった電池 (破棄する予定の電池)

⑨ その他 → (具体的に (必須入力))

Q11

Q2で「誤飲したことがある」／「誤飲しそうになってヒヤリとしたことがある」と答えた方に質問です。

誤飲したことのある/誤飲しそうになった製品について、その時の経験の詳細を、記入例を参考に教えてください。

複数経験がある方は、最も危害の程度が大きかったときのことを回答してください。

【記入例1】

製品名称：未使用の電子たばこ

具体的な経験の内容：電子たばこを詰め替えようとして、カプセルを机の上に置いたところ丁度電話が鳴り、そのまま放置しておいたところ、子供が口にくわえていた。

口の中には入れてなかったが、ヒヤリとした。

【記入例2】

製品名称：風邪薬

具体的な経験の内容：甘い味のするシロップ状の風邪薬を飲ませたところ、目を離した隙に残りの風邪薬を飲んでしまった。

ただ、飲んだ量は少なかったため病院へ行かず家で様子を見た。



▲ とじる

製品名称

具体的な経験の内容

ここからは、お子さんの誤飲事故に対する認識及び対策について伺います。

Q12

乳幼児の誤飲で特に危険と思う製品を以下の中から1つだけ選んでください。

◎ 単一回答

★ 必須回答

- ① たばこ
(たばこ、電子たばこ、加熱式たばこ、使用済みのたばこ(吸殻・使用済みカプセル)、たばこの浸出液、その他)
- ② 医薬品
(風邪薬、胃腸薬、外皮用薬、眼科用剤、耳鼻科用剤、その他)
- ③ 玩具
(ビー玉、ビーズ、スーパーボール、ブロック・積み木、ミニカー、食べ物の形をした玩具(ままごと玩具)、シール、玩具の弾丸、シャボン玉液、ケミカルライト、磁石を使った玩具、その他の小型玩具)
- ④ 洗剤
(食器洗い用洗剤、衣料用洗剤、トイレ用洗剤、風呂用洗剤、漂白剤(食器用)、漂白剤(衣類用)、カビ取り剤、その他)
- ⑤ 石鹸・化粧品等
(化粧品、マニキュア・マニキュア除去液、固形石鹸、ボディシャンプー、歯磨き粉、シャンプー・リンス・コンディショナー、入浴剤、その他)
- ⑥ 乾燥剤・殺虫剤・芳香剤等
(乾燥剤・脱酸素剤(食品用)、消臭剤・脱臭剤、衣類用防虫剤、殺虫剤、保冷剤、その他)
- ⑦ 電池
- ⑧ その他家庭用品
(硬貨、磁気治療器、磁石、紙、ペットボトルの蓋、アクセサリー、ケーキの飾り、ビニール袋、水を含むと膨らむ製品、その他)
- ⑨ 食品
(飴、パン、ベビー用のせんべい・ビスケット、ゼリー(こんにやく入りゼリー以外)、こんにやく入りゼリー、ご飯(米)、餅、果物、豆類、その他)
- ⑩ その他
(酒類、しょうゆ、アルコールを含む食品、健康食品・健康補助食品、その他)
- ⑪ 特にない

Q13

誤飲をした時の応急手当の方法を知っていますか。

☉ 単一回答

★ 必須回答

- ☐ ① 講習を受けて知っている
- ☐ ② 講習を受けて無いが知っている
- ☐ ③ 知らない

Q14

あなたがお子さんの誤飲を防ぐために気を付けていることを以下の中から選んでください。

(いくつでも)

✓ 複数回答

★ 必須回答

▲ とじる

- ☐ 1 子供の手の届くところに小さいものを置かない
- ☐ 2 子供から目を離さない
- ☐ 3 玩具等は対象年齢を守る
- ☐ 4 こまめに整理整頓・掃除をし、小さなものが落ちていないか確認する
- ☐ 5 その他 → (具体的に)
- ☐ 6 特にない

Q15


あなたがお子さんの誤飲を防ぐために工夫していることがあったら教えてください。何も無い方は「なし」と記入してください。

【記入例1】

自分が服用している薬はテーブルの上に放置せず、子供の手の届かない上の棚に入れ、鍵をかけるようにしている。

【記入例2】

電子タバコの使用後のスティックは、そのままゴミ箱へ捨てず、中の見えないビニール袋に入れ、きつく縛ってから捨てている。



▲ とじる

Q16

誤飲について、その他身の回りの製品で危険を感じたりヒヤリ・ハットした事例について教えてください。

特にない方は「なし」と記入してください。

▲ とじる

