

インターネット消費者アンケート調査 概 要

1 「ベビー用のおやつ」を与えた経験

与えたことがある：95.4%

与えたことが多い順：ソフトせんべい（90.5%）
 ポーロ（84.2%）
 ビスケット類（77.3%）
 ウエハース（62.4%）

2 与え始めた時期

	ソフト せんべい	ビスケット類	ウエハース	ポーロ
1歳未満から 与えた割合 [%]	84.7	66.2	66.9	79.3

3 与えた頻度

	ソフト せんべい	ビスケット類	ウエハース	ポーロ
週1回以上 与えた割合 [%]	95.9	94.2	87.2	94.1

4 与えた理由

- 1位：子どもがよく食べるからまたは欲しがるから（45.5～59.5%）
 2位：子どもが食べるか試してみたかったから（37.1～45.0%）
 3位：より多くの離乳食を与えたかったから（18.1～20.0%）
 4位：栄養学的に子どもに必要と考えたから（12.1～15.7%）
 その他の1位：外出時に携帯用として（35人）
 その他の2位：ぐずったときにおとなしくさせるため（19人）

5 購入の際参考にした表示

- 1位：対象月齢表示（80.1～85.7%）
 2位：栄養成分に関する表示（51.7～60.4%）

6 与えるときの注意表示

読んだことがない：35.5%

7 「ベビー用のおやつ」の必要性

- 1位：7～8ヶ月頃から必要（28.1%）
 2位：9～11ヶ月頃から必要（21.0%）
11ヶ月以下から必要は63.0%
 必要ない（11.9%）

8 危害及びひやり・ハツとの有無

あった：212人(22.1%)

(1) 危害及びひやり・ハツとの状況（記載があったもののみ集計）

種類	ひやり・ハツとの状況	件数
ソフトせんべい	喉に張り付いた	25
	口に頬張りすぎた	18
	大きいまま口に入ってしまう	14
	かまずに飲み込んだ	8
	長いまま持たせて、口に入ってしまう	3
	うまく飲み込めない	1
	飲み物と一緒に与えたが喉に引っかかった	1
	飲み物を飲まずに食べた	1
ポーロ	口に頬張りすぎた	28
	かまずにそのまま飲み込んだ	16
	喉に張り付いた	3
	遊びながら食べた	1
ビスケット	口に頬張りすぎた	20
	うまく噛み砕いて飲み込めなかった	10
	大きいまま口に入ってしまった	9
	喉に張り付いた	5
	スティック状のビスケットを大きく噛み切った	4
ウエハース	喉に張り付いた	28
	口に頬張りすぎた	13
	上手に飲み込めない	8
	大きいまま口に入ってしまった	1

(2) 危害及びひやり・ハツと発生時の月齢（記載があったもののみ集計）

	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	12ヶ月～	計
件数	4	10	21	27	21	16	2	36	19	156

