

## 食べ物による窒息事故を防ぐために

### 1 乳幼児、高齢者などでは食べ物による窒息がおきやすい

乳幼児、高齢者などでは、食べ物による窒息がおきやすいため、その予防や応急手当について知っておくことが必要です。気道が3～6分間閉塞されると死亡することもあります。乳幼児で窒息が起こりやすいのは、臼歯がなく食べ物を噛んですりつぶすことができない、また、食べるときに遊んだり泣いたりするなどのためです。また、高齢者では摂食・嚥下（食べ物を口から食道を経て胃に送る）機能が低下しているため、ご飯やパンなど粘りのある食べ物など咀嚼（噛み砕くこと）しにくく大きな塊のまま喉に入って窒息に至ることもあります。乳幼児で窒息を起こす原因になった食べ物としては、ナッツ類、丸いあめ、ブドウ、プチトマト、もち、ちくわ、たくあん、こんにやく入りゼリー、生のにんじん、棒状のセロリ、リンゴ、ソーセージ、肉片、こんにやく、ポップコーン、おせんべい、ベビー用のおやつなどが報告されています。厚生労働省の統計によれば、食べ物による窒息の死亡者数<sup>\*</sup>は、最近では毎年4千名を超えています。

<sup>\*</sup>厚生労働省人口動態調査の死因において、原死因（直接に死亡を引き起こした一連の事象の起因となった疾病または損傷）として「食べ物の誤えんによる気道閉塞」に分類されているもの。

### 食べ物による窒息事故を防ぐために

重要なことは、

- 食べ物は食べやすい大きさにして、よく噛んで食べる。
- 食事の際は、なるべく誰かがそばにいて注意して見ている。

乳幼児の食べる機能の発達には個人差があります。周囲の人は子どもの様子を見て、与える食べ物や食べさせ方に配慮しましょう。具体的には、

- 誤って気管支に入りやすいピーナッツなどの豆類は3歳頃までは食べさせない。急停車する可能性のある車や揺れる飛行機の中では食べさせない。
- 「ベビー用のおやつ」は、表示されている月齢のみを参考にするのではなく、子どもの様子を見て食べさせる。食べさせる前に、子どもにとって本当に必要なか考える。商品に表示されている注意にしたがって食べさせる。
- あおむけに寝た状態や、歩きながら、遊びながら、ものを食べさせない。
- 食べ物を口に入れたままの会話、テレビを見ながらの食事はさせない。
- 小さな食べ物を放りあげて口で受けるような食べ方をさせない。
- 食事中に乳幼児をびっくりさせるようなことはしない。
- 乳幼児に食べることを無理強いしない。
- 年長の子どもが乳幼児に危険な食べ物を与えることがあるので注意する。
- 嚥下障害をもつ障害児では食べ物による窒息がおこりやすく、十分な注意が必要である。

高齢者では、だ液の分泌も少なく、咀嚼機能が低下するので、以下のような食物形態について注意が必要です。

〔加熱してもやわらかくなりにくいもの（いかやたこ、きのこ類など）、硬いもの（ナッツ類など）、厚みのないもの（海苔やレタスなど）、パサパサしたもの（パン、ふかし芋など）、繊維の強いもの（青菜類など）〕

また、口の中の乾燥、歯の喪失なども咀嚼機能の低下につながるなので、食事の際には、お茶や水などで口の中を湿らせ水分をとりながら食べるとともに、歯周病予防や義歯の調整などにも心掛けてください。

## 2 こんにゃく入りゼリーによる窒息事故に注意しましょう

こんにゃく入りゼリーについては、子どもや高齢者を中心に窒息事故が起きています。独立行政法人国民生活センターは平成7年以降に死亡事故事例22件が発生しているとし、消費者に対し注意喚起しています。

窒息事故防止のため、平成19年9月、こんにゃく製造業や菓子製造業など関係業界団体では、一口タイプのこんにゃく入りゼリーが子供や高齢者には不向きであることを表す、統一的な警告マークや注意書きを袋に表示することを決定しました。また、この事故防止の取組の継続性の確保のため、一定期間毎に調査等を行い、取組状況のフォローを行うとしています。平成20年10月には、関係業界団体はさらなる表示の改善・強化等の事故防止強化策を講ずるとしています。



## 3 万が一、つまった時のために応急手当を覚えておきましょう

119番通報を誰かに頼み、ただちに以下の方法でつまった物の除去を試みます。

### 〔背部叩打法〕

乳幼児では、口の中に指を入れずに、乳児は片腕にうつぶせに乗せ顔を支えて（図1）、また、少し大きい子は立て膝で太ももがうつぶせにした子のみぞおちを圧迫するようにして（図2）、どちらも頭を低くして、背中を平手で何度も連続して叩きます。なお、腹部臓器を傷つけないよう力を加減します。



図1 背部叩打法（乳児）



図2 背部叩打法変法（少し大きい子）

### 〔ハイムリッヒ法（腹部突き上げ法）〕

大人や年長児では、後ろから両腕を回し、みぞおちの下で片方の手を握り拳にして、腹部を上方へ圧迫します（図3）。この方法が行えない場合、横向きに寝かせて、または、座って前かがみにして背部叩打法を試みます。



図3 ハイムリッヒ法（年長児）

高齢者では食べ物が口の中にたまっているのが見えれば、まず、ハンカチやガーゼなどを巻いた指で口から掻き出すことを試みます。

参考資料：

山中龍宏，子どもの誤飲・事故（やけど・転落など）を防ぐ本，株式会社三省堂，1999

藤谷順子/横塚百合子/英裕雄 編著，誤嚥を防ぐケアとリハビリテーション，(株)日本看護協会出版会，2006

藤谷順子，窒息，臨床栄養 Vol. 111 No. 4 2007.9 (臨時増刊号)，医歯薬出版株式会社，2007

向井美恵 鎌倉やよい 編集，ナーシングムック 20 摂食・嚥下障害の理解とケア，株式会社 学習研究社，2003

鎌倉やよい 向井美恵 編集，訪問看護における摂食・嚥下リハビリテーション 退院から在宅まで，2007

日本救急医療財団 監修，心肺蘇生法委員会 編著，改訂3版 救急蘇生法の指針（市民用・解説編），へるす出版，2006

厚生労働省 厚生労働省統計表データベースシステム 人口動態調査  
[http://www.dbtk.mhlw.go.jp/IPPAN/ippan/scm\\_k\\_Ichiran](http://www.dbtk.mhlw.go.jp/IPPAN/ippan/scm_k_Ichiran)

子どもに安全をプレゼントー事故防止支援サイトー（国立保健医療科学院）  
<http://www.niph.go.jp/soshiki/shogai/jikoboshi/index.html>

家庭でできる応急手当1ー窒息したり、溺れたら・・・

<http://www.niph.go.jp/soshiki/shogai/jikoboshi/general/infomation/firstaid.html>

応急手当パンフレット 9) 誤飲、喉頭異物（窒息）

<http://www.niph.go.jp/soshiki/shogai/jikoboshi/public/pdf/oukyu09.pdf>

iー子育てネット（財団法人こども未来財団）

<http://www.i-kosodate.net/index.html>

子供の事故予防に取り組む 窒息の予防（文責／日本小児保健協会）

<http://www.i-kosodate.net/health/accident/accident04.html>

ママの救急箱（ケガの応急手当） 窒息

<http://www.i-kosodate.net/health/aid/200111.html>



関連情報：

➤ 内閣府国民生活局（リンク）

こんにゃく入りゼリー事故に関する注意情報について

<http://www5.cao.go.jp/seikatsu/080930konnyaku.pdf>

こんにゃく入りゼリーによる窒息事故の再発防止について

<http://www5.cao.go.jp/seikatsu/konnyaku/081016konnyaku.pdf>

➤ 内閣府食品安全委員会（リンク）

トピック「こんにゃく入りゼリー」による窒息事故について

<http://www.fsc.go.jp/sonota/konnyakujellyjiko1907.html>

➤ 厚生労働省（リンク）

食品による窒息事故の研究結果等について

<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/chissoku/index.html>

厚生労働省統計表データベースシステム 人口動態調査

<http://www.dbtk.mhlw.go.jp/toukei/index.html>

(参考) 人口動態調査 表「不慮の事故の種類別にみた年齢別死亡数」のうち「その他不慮の窒息」の「気道閉塞を生じた食物の誤えん」によるもの  
(人)

平成	総数	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～29歳	30～44歳	45～64歳	65～79歳	80歳～	不詳
7年	3,846	39	28	2	5	17	59	596	1,329	1,770	1
8年	3,669	43	16	5	3	23	63	526	1,260	1,728	2
9年	3,669	35	15	6	1	23	62	510	1,228	1,786	3
10年	3,956	40	10	6	3	18	68	537	1,332	1,942	-
11年	4,081	29	7	3	4	15	67	559	1,417	1,979	1
12年	3,985	31	14	6	4	16	59	534	1,353	1,967	1
13年	4,223	26	8	-	2	18	58	621	1,454	2,035	1
14年	4,187	27	11	3	2	23	60	525	1,406	2,129	1
15年	4,207	16	14	2	4	16	64	504	1,434	2,153	-
16年	4,206	18	15	2	3	17	57	526	1,424	2,144	-
17年	4,485	24	7	3	6	19	63	566	1,467	2,329	1
18年	4,407	18	16	2	1	8	80	553	1,371	2,358	-
19年	4,372	13	12	8	1	11	69	465	1,344	2,449	-

➤ 文部科学省 (リンク)

学校給食のパンによる窒息事故の発生について

[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/houdou/20/10/08102201.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/10/08102201.htm)

「こんにゃく入りゼリー」による窒息事故に関する学校給食における食品の安全確保について

[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/houdou/20/10/08100210.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/10/08100210.htm)

➤ 農林水産省 (リンク)

こんにゃく入りゼリーに関する調査結果

[http://www.maff.go.jp/j/press/2007/20070808press\\_1.html](http://www.maff.go.jp/j/press/2007/20070808press_1.html)

ミニカップタイプのこんにゃくゼリーにご注意!

[http://www.maff.go.jp/j/konjac\\_jelly/index.html](http://www.maff.go.jp/j/konjac_jelly/index.html)

➤ 独立行政法人国民生活センター (リンク)

ミニカップタイプのこんにゃく入りゼリーによる事故防止のために  
—消費者への警告と行政・業界への要望—

[http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20070705\\_1.html](http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20070705_1.html)

こんにゃく入りゼリーによる死亡事故一覧 [2008年11月7日:公表]

[http://www.kokusen.go.jp/soudan\\_now/data/sn-20081107.html](http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sn-20081107.html)

➤ 東京消防庁 (リンク)

トップページ <http://www.tfd.metro.tokyo.jp/index.html>

「安心・安全」トピックスに、以下の情報が掲載されています。

食べ物のをどに詰まらせた救急事故の発生状況

<http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/2008-1940-20/index.html>

こんにゃく入りゼリーに係る救急事故について

<http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/2008-1940-19/index.html>

- 東京商品等安全対策協議会（リンク）  
報道発表資料「ベビー用のおやつ」による窒息に注意しましょう！  
[http://www.anzen.metro.tokyo.jp/tocho/kyougikai/8th/8th\\_kyougikai\\_houkoku.html](http://www.anzen.metro.tokyo.jp/tocho/kyougikai/8th/8th_kyougikai_houkoku.html)
  
- 日本歯科医師会（リンク）  
窒息予防チラシ・ポスター  
<http://www.jda.or.jp/about/chissoku.html>